



Abroflor[®] gel

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopatisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van uw arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Abroflor gel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Abroflor gel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Abroflor gel gebruikt
3. Hoe wordt Abroflor gel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Abroflor gel?
6. Algemene informatie

Abroflor[®] gel

Per 100 g bevat Abroflor gel het werkzame bestanddeel: 10 g Abrotanum oertinctuur.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: hama-

melidis water; carbomeer; methyl parabeen (E218), natrium EDTA en triethanolamine.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopatheilijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-9011).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 80031.

I. Wat is Abroflor gel en waarvoor wordt het gebruikt?

Abroflor gel is een homeopatisch geneesmiddel, dat wordt toegepast bij winterhanden en wintervoeten.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Verpakking

De gel wordt verpakt in een tube met een inhoud van 75 gram, voorzien van een schroef-dop.

2. Wat u moet weten voordat u Abroflor gel gebruikt

Wanneer mag u Abroflor gel niet gebruiken?

Abroflor gel mag u uitsluitend gebruiken op een intacte huid, dus niet bij open wonden. Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden Abroflor gel te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Abroflor gel?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Abroflor gel moet zijn.

Gebruik van Abroflor gel in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Abroflor gel in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Abroflor gel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Abroflor gel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Abroflor gel

In een enkel geval kan een overgevoeligheidsreactie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Abroflor gel (nogmaals) te gebruiken. Vraag indien nodig uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Abroflor gel in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Abroflor gel gebruikt?

Abroflor gel is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. De tube kan met behulp van de punt in de dop worden geopend. De gel meerdere malen per dag aanbrengen en licht inmasseren. De ingesmeerde huid kan afgedekt worden, om vlekken in kleding te voorkomen. U kunt Abroflor gel ook in een dunne laag onder een verband of kompres opbrengen. Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Abroflor gel wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoeligheidsreactie voordoen in de vorm van een huidirritatie. Deze irritatie is te herkennen aan een jeukende huiduitslag die vaak met roodheid begint. Deze uitslag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Abroflor gel. Indien de huiduitslag niet binnen een week na het stoppen van het gebruik over is, dient u contact met uw arts op te nemen. Voor personen met een dergelijke overgevoeligheid is het gebruik van dit geneesmiddel af te raden. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Abroflor gel?

Abroflor gel buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op de tube. U vindt de datum op het doosje en de tube na of onder de woorden "Niet te gebr. na:" (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

6. Algemene informatie

Winterhanden en -voeten worden gekenmerkt door een verminderde doorbloeding in handen en voeten ten gevolge van blootstelling aan kou. Kenmerkend voor de klachten bij het homeopathisch geneesmiddelbeeld van Abrotanum zijn roodblauwe, pijnlijke en jeukende plekken op handen en voeten en roodheid en couperose in het gelaat. Abroflor bevordert een gezonde doorbloeding van de huid.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 26 november 2004.

E00657-1.0-W
230336630

©VSM

