

wordt aangeraden de dosering van 1 maal daags 600 mg 5 mōrgens in te nemen. Voor kinderen jonger dan 7 jaar zijn er andere acetylcysteïne bevattende producten met een lagere sterkte in de handel.

Wijze van gebruik

De benodigde dosis kan worden ingenomen door deze op te lossen in een half glas water. De zo ontstane oplossing direct opdrinken en niet bewaren.

In geval u merkt dat Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van een overdosering kunnen zijn: maagklachten en braken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers te gebruiken

Gebruik nooit een dubbele dosis van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers om zo de vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

4 Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmstelselaandoeningen

Maagklachten (zoals misselijkheid en braken) komen voor, bij lage doseringen gebeurt dit zelden. Bij patiënten met een maagzweer kan acetylcysteïne een ongunstige werking hebben op het maaglijmvlies.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zelden: overgevoeligheidsreacties.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5 Hoe bewaart u Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers?

Geneesmiddelen buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers in een buisje: beneden 30°C, op een droge plaats in de goed gesloten originele verpakking bewaren.

Gebruik Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:".

Deze bijsluiters is voor het laatst herzien in april 2009.

S A M E N W E R K E N D E

APOTHEKERS®



600 mg

bij
**Vastzittende
hoest door taai slijm**

**Acetylcysteïne
600 mg bruistabletten
Samenwerkende Apothekers**

10 bruistabletten

**Volwassenen en
kinderen vanaf 7 jaar**



Lees de bijsluiters zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiters, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiters

1. Wat is Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt.
3. Hoe wordt Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers?

Apothekers

Het werkzame bestanddeel is: Acetylcysteïne. Een bruistablet Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers bevat 600 mg acetylcysteïne. **Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:** ascorbinezuur (E300), citroenzuur (E330) lactose, mannitol (E421), natriumcarbonaat (E500), natriumcyclamaat, natriumwaterstofcarbonaat (E500a), saccharinenatrium (E954), trinitriumcitraat (E331c) en smaakstof.

Registratiehouder

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

In het register ingeschreven onder:

RVG 23631=20515 Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

1 Wat is Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Bruistabletten.

Per bruistablet 600 mg acetylcysteïne.

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers zijn per 10 tabletten verpakt in polypropyleen of aluminium buisje met een kunststof dop. In de dop is een droogmiddel geïntegreerd.

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten zijn ook verkrijgbaar per 6 tabletten verpakt in 3 strips met elk 2 bruistabletten in aluminium/polyethyleen/papier sachets. Niet alle genoemde verpakkingsoortjes hoeven in de handel te worden gebracht.

Geneesmiddelgroep

Het werkzaam bestanddeel acetylcysteïne behoort tot de groep mucolytica. Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat slijm in de longen verdund wordt waardoor het ophoesten wordt vergemakkelijkt.

Toepassing van het geneesmiddel

Acetylcysteïne wordt gebruikt bij de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen en bij vastzittende hoest, waarbij verdunning van het slijm van de luchtwegen nodig is om het ophoesten ervan te vergemakkelijken, zoals bij bronchitis (dit is een ontsteking van de vertakkingen van de luchtwegen tussen luchtpijp en longen (bronchiën)), emfyseem (een aandoening waarbij de longen, minder goed werken omdat het longweefsel blijvend stugger is geworden), taaislijm-ziekte (mucoviscidose) en bronchiectasieën (een bepaalde aandoening waarbij de bronchiën voortdurend verwijd zijn).

2 Wat u moet weten voordat u Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt.

Gebruik Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers niet

Wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen (zie "Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn")

Wees extra voorzichtig met Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten

Samenwerkende Apothekers

Wanneer u een maagzweer heeft of heeft gehad. Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers kan de beschermende laag slijm op de maagwand dunner maken. Patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad mogen dit geneesmiddel uitsluitend op voorschrijven van de arts gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Acetylcysteïne kan in lage dosering voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Acetylcysteïne kan in lage dosering voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Alhoewel onvoldoende gegevens bekend zijn is het niet waarschijnlijk dat door het gebruik van acetylcysteïne de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen ongunstig wordt beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft geadviseerd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat 138,8 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdiet.

Gebruik van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Acetylcysteïne mag samen met andere geneesmiddelen gebruikt worden. Indien u bepaalde soorten antibiotica (β -lactam antibiotica zoals penicillinen en cefalosporinen) voorgeschreven heeft gekregen mag u deze middelen niet met acetylcysteïne mengen voor het innemen. Het kan zijn dat de antibiotica door het mengen in de oplossing onwerkzaam is geworden. Het kan elkaar innemen van acetylcysteïne en deze soorten antibiotica is wel toegestaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3 Hoe wordt Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt?

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg eenmaal per dag.

Bij patiënten met een gedempte hoestreflex (bejaarden en verzwakte patiënten)