

Waarop moet u letten als u **gelijktijdig** een ander (genees)middel gebruikt?

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen) kan de neiging tot bloeden toenemen. Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol wordt de kans op maagklachten groter.

Invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening te worden gehouden.

Wat te doen bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding?

Acetylsalicylzuur mag in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts worden gebruikt; acetylsalicylzuur mag niet worden gebruikt gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Dosering

Volwassenen: 2-3 bruistabletten per keer; maximaal 12 bruistabletten (= 4000 mg) per 24 uur, verdeeld over 4 of meer giften.

Kinderen 12 jaar en ouder: 1 bruistablet per keer; maximaal 6 bruistabletten (= 2000 mg) per 24 uur, verdeeld over 6 giften.

De tijd tussen twee innames moet bij kinderen minstens 4 uur bedragen.

Wanneer de klachten (koorts en pijn) weer opkomen, is herhaalde toediening toegestaan, maar de maximale dosering (volwassenen: 4000 mg per dag; kinderen 12 jaar en ouder: 2000 mg per dag) mag niet worden overschreden.

Aanwijzingen voor het gebruik

De bruistabletten oplossen in een glas water en de oplossing opdrinken.

Indien een snel effect gewenst is, verdient toediening op de nuchtere maag, of tenminste een half uur vóór de maaltijd de voorkeur.

Wanneer maagklachten optreden, dienen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd te worden ingenomen.

Wat te doen bij overdosering?

Bij een matige overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, overgeven en maagpijn.

Bij een ernstige overdosering treden op hyperventilatie, transpireren, oorsuizen, onrust, hallucinaties en spierkrampen; in zeer ernstige gevallen treedt bewusteloosheid op en kan ademstilstand ontstaan.

Indien een te hoge dosis is ingenomen en er zich tekenen van overdosering voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd. Deze oordeelt of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Aanwijzingen voor het bewaren

Alka-Seltzer dient in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15°C-25°C) te worden bewaard; niet in een vochtige omgeving (badkamer!).

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld (achter 'Niet te gebruiken na:') en op de strip (achter de afkorting EXP).

Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen!

Verpakking

Alka-Seltzer is verkrijgbaar in een verpakking met 20 bruistabletten: 10 strips met elk 2 bruistabletten.

RVG-nummer

Alka-Seltzer is in het register ingeschreven onder RVG 01147.

Augustus 1994

Bayer 



Alka-Seltzer®

bruistablet 324 mg acetylsalicylzuur (acetosal)

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten gewijzigd zijn.

Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B. V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht
Tel. 0297-280666

Naam van de fabrikant

Bayer AG, Duitsland

Naam van het geneesmiddel

Alka-Seltzer

Samenstelling

Per bruistablet 324 mg acetylsalicylzuur (acetosa); met buffer. Een bruistablet bevat 442 mg natrium. De bruistabletten zijn aan de ene zijde vlak en aan de andere zijde voorzien van een opstaande rand en de opdruk Alka en Seltzer (onder elkaar).

Werking

Acetylsalicylzuur werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend.

Waarvoor wordt Alka-Seltzer gebruikt?

Alka-Seltzer kan worden gebruikt bij:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- hoofdpijn
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn
- reumatische pijn.

Wanneer mag Alka-Seltzer niet worden gebruikt?

Alka-Seltzer mag niet worden gebruikt door:

- maagpatiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
- patiënten met een maag-/darmzweer
- patiënten met maag-/darmbloedingen
- patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of andere soortgelijke pijnstillers (bv. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
- patiënten met leveraandoeningen
- patiënten met ernstige nierklachten
- patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie en hypotrombinemie)
- patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld
- patiënten met een natriumbepert (zoutarm) dieet.

Bijwerkingen

Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:

- maagklachten (dan gebruik stoppen)
- bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
- overgevoeligheidsverschijnselen
- verlenging van de bloedingstijd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen. Gebruik geen acetylsalicylzuur vóór of na het trekken van tanden of kiezen. Neem geen acetylsalicylzuur in kort vóór of kort na gebruik van alcohol. Bij kinderen met waterpokken of griep mag acetylsalicylzuur alleen op advies van de arts worden toegepast.