



ASPIRINE® KAUWTABLET

kauwtablet 500 mg acetylsalicylzuur

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten gewijzigd zijn.

Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht
Tel. 0297-280666

Naam van het geneesmiddel

Aspirine kauwtablet

Samenstelling

De *werkzame stof* is acetylsalicylzuur. Aspirine kauwtablet bevat 500 mg acetylsalicylzuur per tablet. Verder bevat de kauwtablet de volgende *hulpstoffen*: ascorbinezuur, aspartaam, calciumstearaat, citroenzuur, magnesiumcarbonaat, mandarijnsap-aroma, mannitol, sinaasappelaroma, voorverstijfde zetmeel, natriumcarbonaat, natriumcarboxymethylcellulose, speciaal droogaroma, geeloranje S (E110), aluminiumoxide, maïszetmeel.

Werking

Pijnstillend
Koortsverlagend
Ontstekingsremmend

Waarvoor kan Aspirine kauwtablet worden gebruikt?

Hoofdpijn
Kiespijn
Zenuwpijn
Spit
Spierpijn
Menstruatiepijn
Reumatische pijn
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid
Koorts en pijn na vaccinatie

Door wie mag Aspirine kauwtablet niet worden gebruikt?

Maagpatiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen.
Patiënten met een maag-/darmzweer.
Patiënten met maag-/darmbloedingen en andere bloedingen, zoals hersenbloedingen.
Patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of andere soortgelijke pijnstillers (bv. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen).
Patiënten met leveraandoeningen.
Patiënten met ernstige nierklachten.
Patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie en hypotrombinemie).
Patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld.

Bijwerkingen

Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:

- maagklachten (dan gebruik stoppen)
- bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
- overgevoelighedsverschijnselen
- verlenging van de bloedingsstijd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren uw arts raadplegen.

Geen acetylsalicylzuur gebruiken vóór of na het trekken van tanden of klezen.

Kort vóór of kort na gebruik van alcohol geen acetylsalicylzuur innemen.

Acetylsalicylzuur mag vóór een operatie alleen op advies van een arts worden gebruikt.

Bij kinderen met waterpokken of griep alleen toepassen op advies van de arts.

Aspirine kauwtablet bevat aspartaam. Aspartaam wordt o.a. in fenylalanine omgezet.

Verder bevat de kauwtablet geeloranje S. Deze kleurstof kan allergische reacties, waaronder astma veroorzaken. Overgevoelighedsreacties komen vaker voor bij die personen met overgevoelighed voor acetylsalicylzuur.

Waarop moet u letten als u gelijktijdig een ander middel gebruikt?

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen) kan de neiging tot bloeden toenemen.

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol wordt de kans op maagklachten groter.

Wat te doen bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding

Gebruik in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts; niet gebruiken gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

Dosering

De dosering voor volwassenen bedraagt:

per keer 1-2 kauwtabletten (= 500-1000 mg)

per etmaal maximaal 8 kauwtabletten (= 4000 mg), verdeeld over vier of meer giften.

Afhankelijk van het weer opkomen van de klachten (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan, maar de maximale dosering (4000 mg per dag) mag niet worden overschreden.

Voor kinderen tot 15 jaar wordt verwezen naar Aspirine® 100, tabletten à 100 mg acetylsalicylzuur.

Wijze van gebruik

De tabletten fijnkauwen, daarna doorslikken en vervolgens de mond naspoelen met water.

Indien een snel effect gewenst is, verdient toediening op de nuchtere maag of tenminste een half uur vóór de maaltijd de voorkeur.

Wanneer maagklachten optreden, dient de inname tijdens of vlak na de maaltijd te geschieden.

Wat te doen bij overdosering?

Bij een matige overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, overgeven en maagpijn.

Bij een ernstige overdosering treden op: geforceerd ademen (hyperventilatie), transpireren, oorsuizen, onrust, hallucinaties en spierkrampen; in zeer ernstige gevallen treedt bewusteloosheid op en kan ademstilstand ontstaan.

Indien een te hoge dosis is ingenomen en er zich tekenen van overdosering voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd. Deze oordeelt of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Aanwijzingen voor het bewaren

Niet boven 25°C bewaren.

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld (achter 'Niet te gebruiken na:') en op de strip (achter de afkorting 'EXP').

Houd Aspirine kauwtablet, net als alle andere geneesmiddelen, altijd buiten het bereik van kinderen!

Verpakking

Aspirine kauwtablet is verkrijgbaar in een verpakking met 2 of 10 kauwtabletten à 500 mg (1 resp. 5 strips à 2 kauwtabletten).

RVG-nummer

Aspirine kauwtablet is in het register ingeschreven onder RVG 16362.

Bayer