

# Betadine® shampoo

↑  
hier openen

Hulpstoffen:  
ammoniumnonylfenoxypoly(ethyleenoxy)-  
ethanolsulfaat, parfum, natriumhydroxyde,  
laurinezuurdiethanolamide en gezuiverd water.

Voor desinfectie van de hoofdhuid.

Voor bijsluitertekst: zie binnenzijde.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.

Registratiehouder:

Meda Pharma B.V., Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

RVG 08943 UAD

**MEDA**

Batch / niet te gebruiken na:

720305-7

*Samenstelling:*  
Betadine shampoo bevat 75 mg/ml  
povidonjood.

*Hulpstoffen:* ammoniumnonylfenoxypoly-  
(ethyleenoxy)ethanolsulfaat, parfum,  
natriumhydroxyde, laurinezuurdiethanolami-  
de en gezuiverd water.

*Afleveringsvormen:*  
flacons van 120 ml.

*Werking:*  
Betadine shampoo is een desinfecterende  
(ziektekiemdodend middel) shampoo  
waarvan het werkzame bestanddeel,  
povidonjood, een snelle en lang aanhoudende  
micro-organismedodende (doden van  
uitsluitend microscopisch waarneembare  
organismen zoals bacteriën, schimmels en  
virussen) werking heeft. De werking berust op  
geleidelijk uit deze verbinding vrijkomend  
jodium dat geen pijn veroorzaakt bij contact

met de huid. Door de bruine kleur, die  
duidt op de aanwezigheid van jodium, is  
de plaats zichtbaar waar gedesinfecteerd  
is. De desinfecterende werking van  
Betadine duurt voort zolang de bruine  
kleur zichtbaar is. Povidonjood is een  
desinfectans met een werking tegen een  
groot aantal micro-organismen.  
Ongevoeligheid van bacteriën voor  
Betadine is niet waargenomen.

*Wie is verantwoordelijk voor het in  
de handel brengen?*

Registratiehouder:

Meda Pharma B.V.

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Betadine shampoo is in het register ingeschreven onder RVG 08943.

*Te gebruiken bij:*  
desinfectie van de hoofdhuid.

*Waarschuwingen en voorzorgen:*  
buiten bereik van kinderen houden. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Voorzichtigheid is geboden in geval van jodiumovergevoeligheid en schildklierafwijkingen. Vermijd contact met de ogen. Niet voor babyverzorging. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

*Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding:*  
dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

*Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:*  
invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

*Dosering en wijze van gebruik:*  
bevochtig het haar met warm water, zeep in met circa 5 ml Betadine shampoo, zoals bij shampoo gebruikelijk is. Spoel daarna het haar schoon met warm water.

*Verschuiven bij en behandeling van overdosering:*  
mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Betadine via de mond hebben binnengekregen, dan bestaat de behandeling uit het laten drinken van veel water of melk en eventueel het toedienen van een laxans. Mocht u een overdosering vermoeden waarschuw dan onmiddellijk een arts.

*Bijwerkingen:*  
huidirritatie kan een enkele keer voorkomen. Ook bij patiënten met een bekende jodiumovergevoeligheid veroorzaakt povidonjod slechts zelden huidirritatie. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

*Bewaring en houdbaarheid:*  
bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.

augustus 2006

# Betadine® shampoo

*Hulpstoffen:*  
ammoniumnonylfenoxypoly(ethyleenoxy)-ethanolsulfaat, parfum, natriumhydroxyde, laurinezuurdiethanolamide en gezuiverd water.

Voor desinfectie van de hoofdhuid.

Voor bijsluitertekst: zie binnenzijde. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.

Registratiehouder:  
Meda Pharma B.V., Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

RVG 08943 UAD

Batch / niet te gebruiken na:

**MEDA**