

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**BISOLNASAL met eucalyptus, neusspray oplossing 1,18 mg/ml**
tramazolinehydrochloride**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BISOLNASAL met eucalyptus zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is BISOLNASAL met eucalyptus en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u BISOLNASAL met eucalyptus gebruikt
3. Hoe wordt BISOLNASAL met eucalyptus gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BISOLNASAL met eucalyptus
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BISOLNASAL MET EUCALYPTUS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

BISOLNASAL met eucalyptus is een neusspray met tramazolinehydrochloride.

BISOLNASAL met eucalyptus behoort tot de groep van de α -sympaticomimetica die de zwelling van het neusslijmvlies vermindert. BISOLNASAL met eucalyptus wordt toegepast bij de behandeling van een verstopte neus ten gevolge van neusverkoudheid. De werking van BISOLNASAL met eucalyptus begint geleidelijk, houdt meerdere uren aan en neemt daarna geleidelijk af.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BISOLNASAL MET EUCALYPTUS GEBRUIKT***Gebruik BISOLNASAL met eucalyptus niet***

- Bij gebleken overgevoeligheid voor tramazolinehydrochloride of één van de overige bestanddelen.
- Wanneer u last heeft van rhinitis sicca (= ontstoken, maar niet gezwollen neusslijmvlies).
- Na een operatie aan de hersenen die via de neus is uitgevoerd.
- Bij kinderen onder de 6 jaar, de menthol die dit product bevat kan bij jonge kinderen ernstige benauwdheid en flauwvallen veroorzaken.

Wees extra voorzichtig met BISOLNASAL met eucalyptus

- Voorkom dat de nevel uit de doseerflacon in het oog komt.
- Veelvuldig en langdurig gebruik wordt afgeraden bij ouderen en personen met een verhoogde bloeddruk.
- Bij patiënten met de aandoeningen hartritme stoornissen, suikerziekte, verhoogde schildklierwerking en vergroting van de prostaat, bestaat er kans op verergering van de kwaal bij frequent en langdurig gebruik.

- Bij bepaalde gevallen van verhoogde oogdruk, zogenaamde "nauwe kamerhoek glaucoom", bij een vergrootte prostaat en bij porfyrie (bepaalde erfelijke of verworven ziekte) alleen na overleg met uw huisarts gebruiken.
- Langdurig gebruik van dit soort preparaten kan leiden tot chronische ontsteking (en dus verstopping van de neus) en beschadiging van het neusslijmvlies (zogenaamde rebound verschijnselen, het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate).

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Er zijn geen gegevens over het gebruik van tramazoline bij zwangere vrouwen. Daarom wordt BISOLNASAL met eucalyptus niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding:

Het is niet bekend of tramazoline wordt uitgescheiden in de moedermelk. BISOLNASAL met eucalyptus wordt niet aanbevolen tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik met andere geneesmiddelen


Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Gelijktijdig gebruik met bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid (depressiviteit) (MAO-remmers) of vaatwandvernauwende geneesmiddelen kan leiden tot een stijging van de bloeddruk.

3. HOE WORDT BISOLNASAL MET EUCALYPTUS GEBRUIKT


Hoe u BISOLNASAL met eucalyptus moet gebruiken

1. Maak de neusopeningen één voor één door snuiten vrij.
2. Voordat u de doseerflacon voor de eerste keer gebruikt, eerst enige malen "pompen" totdat u een gelijkmatige spray uit het apparaatje ziet komen (zie figuur 1).



(fig. 1)

3. Houd uw hoofd rechtop. Breng de tuit van de doseerflacon in één van de neusopeningen en druk de andere neusopening dicht.
4. Druk op de doseerflacon en adem tegelijkertijd goed door de neus in (Zie figuur 2).



(fig. 2)

5. Adem daarna door uw mond uit.
6. Houd de doseerflacon ingedrukt totdat u de tuit uit de neusopening verwijderd heeft.
7. Herhaal de behandeling voor de andere neusopening.

Hoe vaak u BISOLNASAL met eucalyptus moet toedienen

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar bedraagt drie- of viermaal daags één of twee verstuivingen in elke neusopening. Maximaal mag men zes maal per dag twee verstuivingen in elke neusopening toedienen.

Hoe lang u BISOLNASAL met eucalyptus moet gebruiken

Niet langer dan een week achtereenvolgend gebruiken zonder uw arts te raadplegen. BISOLNASAL met eucalyptus vermindert net als andere middelen de zwelling van het neusslijmvlies. Gebruik daarom BISOLNASAL met eucalyptus niet langer dan 2 weken ononderbroken.

Wat u moet doen als u meer van BISOLNASAL met eucalyptus heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u per ongeluk teveel BISOLNASAL met eucalyptus gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u bent vergeten BISOLNASAL met eucalyptus te gebruiken

Als u bent vergeten de neusspray te gebruiken kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. U kunt dan de vergeten dosis achterwege laten en gewoon doorgaan met het gebruik van de neusspray. Het is niet schadelijk als u vergeten bent uw neus te sprayen.

Als u stopt met het gebruik van BISOLNASAL met eucalyptus

Wanneer de klachten verdwenen zijn kunt u stoppen met het gebruik van BISOLNASAL met eucalyptus. Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLNASAL met eucalyptus veroorzaakt in het algemeen geen problemen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLNASAL met eucalyptus bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen)
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen)
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 personen)

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaanklasse.

Immuunsysteem

Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen, het is onbekend hoe vaak dit voorkomt.

Psychische stoornissen

Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) kunnen optreden, het is onbekend hoe vaak dit voorkomt.

Zenuwstelselaandoeningen

Hoofdpijn kan soms optreden. Duizeligheid en smaakstoornis treden zelden op. Rusteloosheid, slaperigheid en slapeloosheid kunnen voorkomen, het is onbekend hoe vaak dit voorkomt.

Hartaandoeningen

Soms treden hartkloppingen op. Versnelde hartslag (tachycardie) en stoornissen in het hartritme (aritmieën) kunnen optreden, het is onbekend hoe vaak dit voorkomt.

Ademhalingsstelsel

Vaak kan een branderig gevoel in de neus voorkomen. Droge neus, niezen en een zwelling van het neusslijmvlies treden soms op. Zelden kan een loopneus of een neusbloeding optreden.

Maagdarmstelsel

Soms kan misselijkheid voorkomen.

Onderzoeken

Het kan voorkomen dat de bloeddruk verhoogd wordt, het is onbekend hoe vaak dit gebeurt.

Zoals bij alle lokaal toegediende α -sympaticomimetica kan langdurig en overmatig gebruik leiden tot een overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel; een ziekelijke vermeerdering van het bloed in het gehele lichaam (reactieve hyperemie).

In geval er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BISOLNASAL MET EUCALYPTUS

BISOLNASAL met eucalyptus buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden de 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik BISOLNASAL met eucalyptus niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter 'niet te gebruiken na' of 'EXP'.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat BISOLNASAL met eucalyptus

- Het werkzame bestanddeel is 1,18 mg/ml tramazolinehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn benzalkoniumchloride toegevoegd, eucalyptol, levomenthol, kamfer, citroenzuur (E330), natriumhydroxide, hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), polyvidon, glycerol, magnesiumsulfaat (E518), magnesiumchloride, calciumchloride (E509), natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet BISOLNASAL met eucalyptus er uit en wat is de inhoud van de verpakking

BISOLNASAL met eucalyptus doseerflacon (10 ml), een glazen flacon met plastic handpompje.

BISOLNASAL met eucalyptus doseerflacon bevat geen drijfgas.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Boehringer Ingelheim bv

Consumer Health Care

Comeniusstraat 6

1817 MS ALKMAAR

Tel. : 0800– 2255889

Email: bisolnasal.nl@boehringer-ingelheim.com

BISOLNASAL met eucalyptus is in het geneesmiddelenregister ingeschreven onder RVG 22332.

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Italië

Informatie voor de gebruiker

Neusverkoudheid is wel een vervelende, maar gelukkig geen ernstige aandoening. De meeste mensen worden minstens één keer per jaar verkouden, meestal in het voor- of najaar. Neusverkoudheid wordt gemakkelijk van de ene op de andere persoon overgebracht. De eerste verkoudheidsverschijnselen beginnen twee tot vier dagen na besmetting. Het begint vaak met hoofdpijn. Het neusslijmvlies is dan rood en gezwollen. De neus raakt verstopt en het reukvermogen kan tijdelijk verloren gaan. Na een paar dagen kan de keel geïrriteerd en pijnlijk worden, hetgeen niesbuien kan uitlokken. De afscheiding uit de neus is aanvankelijk waterig, maar wordt later slijmerig.

Een neusspray kan tijdens neusverkoudheid veel verlichting geven. BISOLNASAL met eucalyptus vermindert de zwelling van het neusslijmvlies. De verstopte neus gaat open en u kunt weer vrij door uw neus ademen.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2010