

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**BISOLVON® druppels voor kinderen, 2 mg/ml**
broomhexinehydrochloride

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BISOLVON druppels voor kinderen zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat zijn BISOLVON druppels voor kinderen en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u BISOLVON druppels voor kinderen gebruikt
3. Hoe worden BISOLVON druppels voor kinderen gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BISOLVON druppels voor kinderen
6. Aanvullende informatie

1. WAT ZIJN BISOLVON DRUPPELS VOOR KINDEREN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT

BISOLVON druppels voor kinderen is een oplossing met broomhexinehydrochloride als werkzame stof.

BISOLVON is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON druppels voor kinderen maken het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT UW KIND BISOLVON DRUPPELS VOOR KINDEREN GEBRUIKT***Gebruik BISOLVON druppels voor kinderen niet***

- Bij gebleken overgevoeligheid voor broomhexinehydrochloride of één van de andere bestanddelen van BISOLVON druppels voor kinderen.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wees extra voorzichtig met BISOLVON druppels voor kinderen

- Indien uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Het is raadzaam om dan voor het gebruik uw arts te raadplegen.
- U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
- Als de hoestklachten aanhouden of zich dikwijls herhalen. Het is verstandig dan contact op te nemen met uw arts.
- In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossers zoals BISOLVON druppels voor kinderen melding gemaakt van ernstige aandoeningen van de huid, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/verveling van de huid (Lyell's syndroom). In de meeste gevallen hadden deze klachten andere oorzaken dan het gebruik van de slijmoplosser. Echter indien tijdens het gebruik van BISOLVON

druppels voor kinderen huid- of slijmvliesaandoeningen ontstaan dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen en dient uw kind te stoppen met het gebruik van BISOLVON druppels voor kinderen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Gelijktijdig gebruik van BISOLVON druppels voor kinderen en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u BISOLVON gebruikt.

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van BISOLVON tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u BISOLVON niet gebruiken als u zwanger bent.

Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet kan worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen BISOLVON te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van dit product kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BISOLVON druppels voor kinderen

BISOLVON druppels voor kinderen bevatten methylparabeen E218 dat allergische reacties kan veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderingsgevallen bronchospasmen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Bisolvon druppels voor kinderen bevat als hulpstof methylparabeen (E218), wat mogelijk (vertraagde) allergische reacties kan veroorzaken

Raadpleeg uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

3. HOE WORDEN BISOLVON DRUPPELS VOOR KINDEREN GEBRUIKT

BISOLVON druppels voor kinderen bevatten geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen.

Vraag advies van een arts als de symptomen van een acute luchtwegaandoening niet snel verbeteren.

In de hals van de flacon bevindt zich een druppelaar. Er is ook een maatbeker toegevoegd (verdeelstrepen 1 t/m 6 ml). 1 ml BISOLVON druppels voor kinderen komt overeen met 15 druppels.

Kinderen van 5 tot 10 jaar: driemaal per dag 2-4 ml

Kinderen van 2 tot 5 jaar: driemaal per dag 12-24 druppels

BISOLVON druppels voor kinderen beginnen na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het

duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. Uw kind moet daarom het innemen van BISOLVON druppels voor kinderen niet te vlug staken.

Naast BISOLVON druppels voor kinderen zijn de volgende BISOLVON producten beschikbaar:

- BISOLVON drank, voor volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar
- BISOLVON tabletten, voor volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar
- BISOLVON drank voor kinderen, voor kinderen vanaf 2 tot 10 jaar

Wat u moet doen wanneer uw kind meer van BISOLVON druppels voor kinderen heeft gebruikt dan zou mogen

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht uw kind toch last krijgen, raadpleeg dan een arts.

Wat u moet doen wanneer uw kind vergeten is BISOLVON druppels voor kinderen te gebruiken

Wanneer uw kind een dosis vergeet, kunt u gewoon met de volgende dosis doorgaan. Geef nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als uw kind stopt met het gebruik van BISOLVON druppels voor kinderen

Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON druppels voor kinderen veroorzaakt geen problemen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen BISOLVON druppels voor kinderen bijwerkingen veroorzaken, hoewel net iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen)
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen)
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 personen)
- zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)
- voorkomen met onbekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaanklasse.

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden kunnen allergische reacties optreden. Het is niet bekend hoe vaak overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) en shock, met als verschijnselen een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) voorkomen. Als deze verschijnselen bij u optreden waarschuw dan direct een arts.

Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid kan soms optreden.

Ademhalingsstelselaandoeningen-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Zelden komt benauwdheid als gevolg van kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) voor.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak kunnen milde bijwerkingen die het maagdarmkanaal betreffen voorkomen. Soms kunnen pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree voorkomen.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden kan huiduitslag (rash) optreden. Zeer zelden kunnen ernstige aandoeningen van de huid optreden, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/verveling van de huid (Lyell's syndroom). Als bij uw kind deze verschijnselen optreden, stop dan met het innemen van BISOLVON druppels voor kinderen en waarschuw direct een arts. Het is niet bekend hoe vaak jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en angioneurotisch oedeem (met verschijnselen als plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie) optreden. Wanneer angioneurotisch oedeem bij uw kind optreedt, stop dan met het innemen van BISOLVON druppels voor kinderen en waarschuw direct een arts.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Soms kan transpireren voorkomen.

Onderzoeken

Soms kunnen tijdelijk verhoogde transaminasegehalten worden gevonden in het bloed

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BISOLVON DRUPPELS VOOR KINDEREN

BISOLVON druppels voor kinderen buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik BISOLVON druppels voor kinderen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' of 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Na openen kan de verpakking gedurende 6 maanden gebruikt worden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevatten BISOLVON druppels voor kinderen

- Het werkzame bestanddeel is: 2 mg broomhexinehydrochloride per ml.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn wijnsteenzuur (E334), p-oxybenzoëzuremethylester (methylparabeen, E218,) en gedemineraliseerd water.

Hoe zien BISOLVON druppels voor kinderen er uit en wat is de inhoud van de verpakking

BISOLVON druppels voor kinderen zijn verkrijgbaar in bruine glazen flessen van 40 ml met een maatbekertje (deelstrepen 1 t/m 6 ml). In de hals van de fles bevindt zich een druppelaar

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: 0800– 2255889

e-mail: bisolvon.nl@boehringer-ingelheim.com

In het geneesmiddelenregister ingeschreven onder RVG 20431

Fabrikant:

Istituto De Angeli S.r.l.
Loc. Prulli, 103/C
50066 Regello (FI)
ITALIË

Informatie voor de gebruiker

Uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid.

Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken, maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. Uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. 'Vastzittende hoest' is dus eigenlijk 'vastzittend slijm'. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011.