



Tabletten, 8 mg

broomhexinehydrochloride

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om BISOLVON tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is BISOLVON tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u BISOLVON tabletten gebruikt
3. Hoe wordt BISOLVON tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BISOLVON tabletten?

BISOLVON® tabletten

- Het werkzame bestanddeel is: 8 mg broomhexinehydrochloride per tablet.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, maiszetmeel en magnesiumstearaat (E470B).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: (072) 566 24 68
e-mail: bisolvon.info@alk.boehringer-ingelheim.com

In het register ingeschreven onder RVG 09246

1. WAT IS BISOLVON TABLETTE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BISOLVON tabletten is een tablet met 8 mg broomhexinehydrochloride. BISOLVON tabletten is verkrijgbaar in een blisterverpakking met 50 stuks.

BISOLVON tabletten is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON tabletten maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BISOLVON TABLETTE GEBRUIKT

Gebruik BISOLVON tabletten niet

- Bij gebleken overgevoeligheid voor broomhexinehydrochloride of één van de overige bestanddelen.
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u of uw kind bepaalde suikers (lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u of uw kind dit geneesmiddel inneemt.

Wees extra voorzichtig met BISOLVON tabletten

- Indien u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Het is raadzaam om dan voor het gebruik uw arts te raadplegen.
- U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
- Als de hoestklachten aanhouden of zich dikwijls herhalen. Het is verstandig dan contact op te nemen met uw arts.

Zwangerschap

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van BISOLVON tabletten tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor de ongeboren vrucht.

Gebruik BISOLVON tabletten in geval van zwangerschap alleen na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Broomhexinehydrochloride wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het gebruik van BISOLVON tabletten dient daarom tijdens het geven van borstvoeding vermeden te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van dit product kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Gebruik van BISOLVON tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Gelijktijdig gebruik van BISOLVON tabletten en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel. Raadpleeg uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

3. HOE WORDT BISOLVON TABLETTEN GEBRUIKT?

BISOLVON tabletten bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen.

Volwassenen en kinderen boven 10 jaar

3 maal daags ½-2 tabletten

Kinderen van 5-10 jaar

3 maal daags ½-1 tablet

BISOLVON tabletten begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. U of uw kind moet daarom het innemen van BISOLVON tabletten niet te vlug staken.

Naast BISOLVON tabletten is er voor volwassenen en kinderen boven de 10 jaar BISOLVON drank beschikbaar. Voor kinderen onder 10 jaar en voor zuigelingen zijn er BISOLVON producten voor kinderen: BISOLVON drank voor kinderen (kinderen vanaf 1 tot 10 jaar) en BISOLVON Druppels voor kinderen (voor zuigelingen en kinderen tot 10 jaar).

Wat u moet doen wanneer u of uw kind te veel van BISOLVON tabletten heeft gebruikt

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht u of uw kind toch last krijgen, raadpleeg dan een arts.

Wat u moet doen wanneer u of uw kind vergeten is BISOLVON tabletten te gebruiken

Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem nooit een dubbele dosis van Bisolvon tabletten in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u of uw kind kunt verwachten wanneer de behandeling met BISOLVON tabletten wordt gestopt

Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON tabletten veroorzaakt geen problemen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLVON tabletten bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen:

- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen)
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen)
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 personen)

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaanklasse.

Immuunsysteem

Zelden kunnen allergische reacties en ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) voorkomen.

Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid kan soms optreden.

Ademhalingsstelsel

Benauwdheid als gevolg van kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan zelden optreden.

Maagdarmstelsel

Vaak treden lichte bijwerkingen op van het maagdarmkanaal. Soms kan misselijkheid, braken en diarree voorkomen.

Huid en onderhuid

Zelden kan huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) optreden. Zelden kan angioneurotisch oedeem optreden, met als verschijnselen plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie.

Algemene aandoeningen

Soms kan transpireren voorkomen.

In geval er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BISOLVON TABLETTEN?

BISOLVON tabletten buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Er is geen speciale bewaar temperatuur. Bewaren in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

BISOLVON tabletten is houdbaar tot de aangegeven datum. Deze datum vindt u op de verpakking achter de aanduiding 'Niet te gebruiken na'.

Informatie voor de gebruiker

U of uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid. Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken, maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. U of uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. 'Vastzittende hoest' is dus eigenlijk 'vastzittend slijm'. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunder. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiters is voor het laatst herzien/goedgekeurd in: november 2008