



Combudoron® Gel

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit antroposofisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om **Combudoron Gel** zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 2 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Combudoron Gel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Combudoron Gel gebruikt?
3. Hoe wordt Combudoron Gel gebruikt?
4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
5. Hoe bewaart u Combudoron Gel?

Combudoron® Gel

Per 100 g bevat Combudoron Gel de volgende werkzame bestanddelen: Arnica montana, planta tota ø 0,5 g/ Urtica urens, herba ø 9,5 g.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glycerol, natriumalginaat, alcohol en water.

Registratiehouder:
Weleda Nederland NV,
Platinastraat 161,
2718 SR Zoetermeer
Tel: 079-3631313

In het register voor homeopathisch farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84689
Niet-receptplichtig AV

1. Wat is Combudoron Gel en waarvoor wordt het gebruikt?

Antroposofisch geneesmiddel voor gebruik bij oppervlakkige brandwonden (met intacte huid), zonnebrand en insectensteken. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de antroposofie.

Informatie over de wettelijke achtergronden van de registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: <http://www.cbg-meb.nl>

De gel is verpakt in een tube met een inhoud van 25 g.

2. Wat moet u weten voordat u Combudoron Gel gebruikt?

Wanneer mag u Combudoron Gel niet gebruiken?

Niet te gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor Arnica.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Combudoron Gel?

Combudoron Gel mag uitsluitend gebruikt worden op een intacte huid, dus niet op open wonden.

Gebruik van Combudoron Gel tijdens zwangerschap

Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Combudoron Gel tijdens borstvoeding

Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Combudoron Gel in combinatie met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Indien u toch een interactie vermoedt, informeer dan uw arts of apotheker.

3. Hoe wordt Combudoron Gel gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven:

Bij brandwonden eerst goed afkoelen met stromend water. De gel, voor alle toepassingen, dun aanbrengen. Gebruik herhalen totdat de pijn wegtrekt. Indien het aanleggen van verband noodzakelijk is, dit alleen op reeds opgedroogde gel aanbrengen. De geleifilm kan met lauwwarm water gemakkelijk worden afgespoeld. Als grotere oppervlakken zijn aangetast verdient behandeling met Combudoron Essence de voorkeur boven Combudoron Gel.

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 2 dagen niet verbeteren.

Niet om in te nemen.

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Combudoron Gel kan in zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken in de vorm van een huidirritatie. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk als het gebruik wordt gestaakt. Indien de huidirritatie niet binnen een week over is, wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Combudoron Gel (nogmaals) te gebruiken.

5. Hoe bewaart u Combudoron Gel?

Combudoron Gel buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Combudoron Gel niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na". Na openen 2 maanden houdbaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien oktober 2007