

MONDSPOELING / MONDSPRAY

Informatie voor de gebruiker

Indien u een verpakking Corsodyl mondspoeling niet heeft aangeschaft en u ontdekt dat de sluitring niet aan de dop vastzit, gebruik dit geneesmiddel dan niet.

Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V., zie voor adresgegevens verderop in deze bijsluiters.

Voor Corsodyl mondspray is deze informatie niet van toepassing.

Naam van het geneesmiddel

Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray.

Wat is de samenstelling van Corsodyl mondspoeling en mondspray?

- Corsodyl mondspoeling en mondspray bevatten 0,2% m/v chloorhexidine digluconaat als werkzaam bestanddeel.
- Overige bestanddelen: ethanol, pepermintolie, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), sorbitol, kleurstof E 124 en gezuiverd water.

Wat is de toedieningsvorm van Corsodyl mondspoeling en mondspray en wat is de inhoud van een verpakking?

- Corsodyl mondspoeling is een heldere, roze oplossing. Een fles Corsodyl mondspoeling bevat 200 ml en is voorzien van een maaddop die, tot de rand gevuld, 10 ml bevat.
- Corsodyl mondspray is een heldere, roze oplossing. Een fles bevat 60 ml. Het spraystuk is los bijgesloten.

Tot welke geneesmiddelengroep behoren Corsodyl mondspoeling en mondspray?

- Chloorhexidine digluconaat is een bacteriedodende vloeistof, die op advies van de (tand)arts kan worden gebruikt. Bovendien voorkomen Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray het ontstaan van tandplak.

Wie is de registratiehouder?

- GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV
Postbus 757
3700 AT Zeist

Corsodyl is a registered trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.

Wat is het registratienummer?

- Corsodyl mondspoeling is in het register ingeschreven onder nummer RVG 09822.
- Corsodyl mondspray is in het register ingeschreven onder nummer RVG 12784.

Waarvoor worden Corsodyl mondspoeling en mondspray gebruikt?

Corsodyl mondspoeling en mondspray worden gebruikt:

- Ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen.
- Voor algemene mondhygiëne indien de tanden door enige handicap (zoals na mondoperaties of bij geestelijk of lichamelijk gehandicapten) niet kunnen worden gepoetst.
- Voor kortdurende toepassing bij tandvleesontsteking.

Waar moet u op letten vóórdat u Corsodyl mondspoeling of mondspray gaat gebruiken?

Wanneer mag u Corsodyl mondspoeling en mondspray niet gebruiken?

- Corsodyl mondspoeling en mondspray mogen niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor chloorhexidine digluconaat, of voor één van de andere bestanddelen.

Waar moet u op letten voordat u Corsodyl mondspoeling of mondspray gebruikt?

- Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding:

Corsodyl mondspoeling en mondspray kunnen voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

- Kinderen:

Corsodyl mondspoeling en mondspray zijn niet geschikt voor kleine kinderen.

- Reactievermogen:

Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray hebben geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

- Speciale waarschuwingen:

- Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dienen Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray niet te worden doorgeslikt en niet te worden toegediend aan kleine kinderen.
- Corsodyl mondspray niet in de ogen verstuiven en niet inhaleren.
- Indien Corsodyl mondspoeling of Corsodyl mondspray in de ogen terecht komt, direct uitspoelen met veel water.

Kunt u Corsodyl mondspoeling en mondspray samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray niet combineren met andere geneesmiddelen voor gebruik in de mond, tenzij op aanwijzing van de (tand)arts.

- De werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray, wordt

nadelig beïnvloed door bestanddelen die in tandpasta aanwezig zijn.

- Tandpoetsen dient daarom vóór het gebruik, of geruime tijd na het gebruik van Corsodyl mondspoeling of Corsodyl mond-spray plaats te vinden.
- Indien u de tandenpoetst direct voor het gebruik, zeer goed naspoelen met water om tandpastaresten te verwijderen.

Hoe gebruikt u Corsodyl mondspoeling en mondspray?

Wat is de dosering van Corsodyl mondspoeling?

- Corsodyl mondspoeling wordt overvond gebruikt.
- Spoel tweemaal per dag gedurende één minuut zorgvuldig de mond met 10 ml Corsodyl mondspoeling (één maatdop tot de rand gevuld). Eventueel kan gespoeld worden met een mengsel van 5 ml Corsodyl mondspoeling en 5 ml leidingwater, direct vóór gebruik gemengd (zie onder Bijwerkingen).
- Ter voorkoming van tandvleesontsteking: tweemaal daags 1 minuut spoelen met 10 ml Corsodyl mondspoeling (één maat dop tot de rand gevuld), gedurende 4 weken.

Wat is de dosering van Corsodyl mondspray?

- Corsodyl mondspray tweemaal daags of volgens advies van de (tand)arts op het tandvlees verstuiwen. Het gehele, te behandelen tandvlees moet in contact komen met de sprayvloeistof. Meerdere malen sprayen zal daarom noodzakelijk zijn.
- Ter voorkoming van tandvleesontsteking wordt tweemaal daags toepassen gedurende 4 weken geadviseerd.
- Een dosis Corsodyl mondspray is 0,14 ml (= 0,28 mg chloorhexidine digluconaat).

Mag na het gebruik van Corsodyl mondspoeling of mondspray het gebit gepoetst worden?

- De tanden mogen niet direct na het spoelen of verstuiwen worden gepoetst. Dit dient te gebeuren direct vóór of geruime tijd er na.

Hoelang mag u Corsodyl mondspoeling of mondspray gebruiken?

- U mag Corsodyl mondspoeling en mondspray niet langer dan 4 weken gebruiken en, zonder medisch voorschrift, niet méér gebruiken dan de aangegeven hoeveelheid.
- Indien uw klachten aanhouden of terugkeren, dient u uw arts of tandarts te raadplegen.

Wat te doen als meer is ingenomen dan is aanbevolen?

- Chloorhexidine digluconaat wordt bij inwendig gebruik nauwelijks opgenomen in het lichaam. Er zijn dan ook geen overdoseringsverschijnselen bekend, en effecten op het lichaam zijn onwaarschijnlijk, zelfs bij inname van grote hoeveelheden. Wij adviseren u bij inname van zeer grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

Wat te doen indien Corsodyl mondspray verstopt raakt?

- Indien de spray verstopt raakt, het spraystuk enige tijd in warm water leggen. De verstopping dient niet mechanisch te worden verwijderd met behulp van bijvoorbeeld een naald, aan gezien dit het sproeikanal beschadigt.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen bij het gebruik van Corsodyl mondspoeling en mondspray?

Een geneesmiddel heeft naast de beoogde werking soms neveneffecten, bijwerkingen genoemd. Bij het gebruik van een geneesmiddel komt het soms voor dat één of meer van deze bijwerkingen optreden. Van Corsodyl mondspoeling en mondspray zijn de volgende bijwerkingen beschreven:

- Huidirritatie
- Er zijn enkele allergische reacties gesignaleerd, die mogelijk aan chloorhexidine digluconaat zijn toe te schrijven.
- Er kan een bruine verkleuring van de tong en tanden voorkomen. Dit kan in sterke mate voorkomen bij het gelijktijdig gebruik van kleurvormende stoffen, zoals in thee, koffie en wijn. Om tandverkleuring te voorkomen kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met een kunstgebitreiniger direct vóór het gebruik van Corsodyl mondspoeling of Corsodyl mondspray overwogen worden. Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.
- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik.
- Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies kunnen voorkomen. Verdunning van de mondspoeling tot een 0,1% oplossing (5 ml mondspoeling + 5 ml leidingwater, dat direct vóór het gebruik gemengd moet worden), kan deze klachten doen verminderen. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik.
- Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen verdween deze nadat de toepassing was gestopt. Indien u na het gebruik van dit geneesmiddel een andere bijwerking constateert, wordt u uitdrukkelijk aangeraden dit te melden aan uw (tand)arts of apotheker.

Hoe moet u Corsodyl mondspoeling en mondspray bewaren en wat is de uiterste gebruiksdatum?

- Corsodyl mondspoeling en Corsodyl mondspray behoren bij kamertemperatuur (15 - 25 °C) te worden bewaard.
- Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren!
- De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld.

Wanneer is deze bijsluiter voor het laatst gewijzigd?

- April 2010