



bij **Misselijkheid,
opgeblazen gevoel en
zure oprispingen**

Domperidon 30 mg zepillen
Samenwerkende Apothekers

Domperidon 60 mg zepillen
Samenwerkende Apothekers

6 zepillen

zepillen voor kinderen 30 mg
zepillen voor volwassenen 60 mg

! Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

1 Wat zijn Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers?

Domperidon 30 mg en 60 mg zepillen Samenwerkende Apothekers zijn wit tot lichtgeel van kleur en torpedovormig. Er zijn Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers voor kinderen en voor volwassenen. Domperidon 30 mg zepillen Samenwerkende Apothekers bevatten 30 mg domperidon per zepil. Domperidon 60 mg zepillen Samenwerkende Apothekers bevatten 60 mg domperidon per zepil.

Domperidon is de stof die zorgt voor de werking van Domperidon 30 mg en 60 mg zepillen Samenwerkende Apothekers. Domperidon zorgt ervoor dat voedsel sneller door de maag en de darmen gaat.

De zepillen bevatten verder: polyethyleenglycol 4000, polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 1000, wijnsteen-zuur (E 334) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320).

Domperidon 30 mg en 60 mg zepillen Samenwerkende Apothekers zijn verpakt in een doosje met 6 zepillen in een strip.

Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk RVG 21173=07682 (Domperidon 30 mg zepillen Samenwerkende Apothekers) en RVG 21174=07683 (Domperidon 60 mg zepillen Samenwerkende Apothekers) op naam van Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam.

2 Wanneer gebruikt u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers?

Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers wordt gebruikt voor de verlichting van misselijkheid en braken (bij kinderen of volwassenen). Bij volwassenen wordt Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers ook gebruikt voor de verlichting van een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en voor terugvloeien van de maaginhoud (oprispingen).

3 Wanneer mag u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet gebruiken?

- U mag Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen in de zepillen. Welke dit zijn, vindt u onder ① 'Wat zijn Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers?'. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers en raadpleeg uw arts.
- Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers mag niet worden gebruikt bij een bepaalde hersentumor (een zogenaamd prolactinoom).
- U mag Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet gebruiken wanneer u ernstige buikkrampen of aanhoudend zwarte ontlasting heeft. In deze gevallen moet u altijd eerst met uw arts overleggen of u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers wel mag gebruiken.

4 Welke speciale voorzorgen moet u nemen?

- **Zwangerschap**
Het is niet bekend of Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers bij zwangerschap schadelijk is. Bent u in verwachting of gedurende de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers kunt gebruiken.
- **Borstvoeding**
Kleine hoeveelheden van stoffen uit Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers zouden in de moedermelk terecht kunnen komen. Daarom is het beter Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet te gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg hierover met uw arts.
- **Kleine kinderen**
Als Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers wordt gegeven aan kleine kinderen, is er een klein risico dat ze last krijgen van bewegingsstoornissen, zoals stijve spieren, trillen en onwillekeurige bewegingen. Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de dosering die uw arts heeft voorgeschreven of aan de dosering zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- **Bij slechte werking van uw lever**
U mag Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet gebruiken als u een leverziekte heeft. U dient eerst een arts te raadplegen.
- **Bij slechte werking van uw nieren**
Neem eerst contact op met uw arts als u een nierziekte heeft en u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers gedurende een lange periode gaat gebruiken.
- **Waarschuwingen**
Wanneer u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Neem contact op met uw arts wanneer uw klachten na 14 dagen nog niet zijn verdwenen. Als u naast Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers ook andere medicijnen gebruikt, lees dan ook het gedeelte ⑤ "Andere geneesmiddelen en Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers" verder in deze bijsluiter.
- **Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke**
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers invloed heeft op het reactievermogen.
- **Extra informatie over bepaalde bestanddelen**
Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers bevatten gebutyleerd hydroxyanisol. Gebutyleerd hydroxyanisol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

5 Andere geneesmiddelen en Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering). Als u naast Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers geneesmiddelen gebruikt die de bewegingen van de maag en de darmen vertragen, kan dit de werkzaamheid van Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers beïnvloeden.

Gebruik geen Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers als u oraal ketoconazole inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of oraal erythromycine (een antibioticum).

Als u andere geneesmiddelen inneemt, met inbegrip van geneesmiddelen gekocht zonder voorschrift, is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts of apotheker.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

6 Dosering van Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers

Als u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers op recept gebruikt, vertelt uw arts of apotheker u hoeveel Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers u moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt:

- **Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (35 kg of meer)**
2 maal per dag 1 zepil voor volwassenen (60 mg domperidon). De duur van de eerste behandeling is 4 weken bij een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en bij oprispingen.

• **Kinderen**

Bij kinderen is de dosering afhankelijk van het lichaamsgewicht.

Zepillen mogen niet gebruikt worden bij kinderen die minder wegen dan 5 kg.

Voor een kind van meer dan 15 kg:

2 maal per dag 1 zepil voor kinderen (met 30 mg domperidon).


Voor een kind van 5 tot 15 kg:

zijn zepillen met 10 mg domperidon van andere fabrikanten beschikbaar.


Als u Domperidon zepillen Samenwerkende Apothekers niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken.

Hoe moet u Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers gebruiken?

- U kunt Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers op elk tijdstip van de dag inbrengen.
- Zetabletten zijn bedoeld om in de anus, van achteren dus, te worden ingebracht.
- Het is het beste om zetabletten in te brengen in een lege endeldarm (dus nadat u ontlasting heeft gehad). Ga daarom, indien nodig, eerst naar het toilet.
- Scheur 1 verpakte zetablet van de totale strip.



- Trek daarna de 2 laagjes waaruit de strip bestaat van elkaar. Dit gaat het gemakkelijkst aan de puntzijde van de strip.



- Neem de zetablet uit de strip. U kunt de zetablet het beste even bevochtigen met wat water. Dan gaat het inbrengen gemakkelijker.
- Het inbrengen gaat ook gemakkelijker als u op uw zij ligt, met uw knieën opgetrokken.
- Breng de zetablet met de punt naar voren in de anus. Blijf dan enige minuten liggen. Soms kan het nodig zijn om de zetablet tegen te houden, bijvoorbeeld met een propje watten. Wanneer u dat prettiger vindt, kunt u de zetablet ook met de stompe kant naar voren inbrengen.
- Probeer te voorkomen dat u binnen een uur na het inbrengen van de zetablet ontlasting heeft.

Stoppen met Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers

Als u Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers op recept gebruikt, stop dan niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.

Wat moet u doen bij overdosering?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ⑥ 'Dosering van Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers'). Raadpleeg in deze gevallen altijd een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: sufheid, verwardheid en bepaalde bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als een kind Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt; ook als de zetablet is ingeslikt.

Wat moet u doen als u bent vergeten uw Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers in te brengen?

Wanneer u bent vergeten uw Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers in te brengen, doe dat dan alsnog zodra u dat merkt. Maar wanneer het al bijna tijd is voor de volgende zetablet, is het verstandiger de vergeten zetablet niet meer in te brengen.

Mogelijke bijwerkingen

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen.

Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

- Hormonale stoornissen: zwelling van de borstklier of afscheiding van melk en menstruatiestoornis.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

- Stoornissen van het zenuwstelsel: abnormale spierbewegingen of tremor (bevingen) kunnen voorkomen. Het risico op dergelijke abnormale spierbewegingen is het grootst bij pasgeboren baby's peuters en kleine kinderen.
- Stoornissen van het immuunsysteem: allergische reacties (bv. huiduitslag, jeuk, kortademigheid, hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht) werden gemeld; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Stoornissen van het cardiovasculair systeem: zeer zelden werden hartritme stoornissen gemeld; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Diarree

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Hoe bewaart u Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers?

De juiste bewaarwijze is:

- in de originele verpakking;
- samen met deze gebruiksaanwijzing;
- niet boven 25 °C;
- **buiten het bereik en zicht van kinderen.**

Hoe lang zijn Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers houdbaar?

Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.

Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd in juni 2008.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...

Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

- Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers of over misselijkheid en braken?

Vragen over Domperidon zetabletten Samenwerkende Apothekers of over misselijkheid en braken kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker. Voor vragen over misselijkheid en braken kunt u ook contact opnemen met de Maag Lever Darm Stichting MLDS: 0900-20 25 625.