

FLUIMUCIL® 600 BRUIS, BRUISTABLETTEN 600 mg

 **Zambon**



Algemeen

Voordat u Fluimucil 600 Bruis gaat gebruiken, is het verstandig om de bijsluiter door te lezen. Ook als u Fluimucil 600 Bruis al eerder heeft gebruikt. De informatie kan namelijk veranderd zijn.

Naam van het product

Fluimucil 600 Bruis, bruistabletten 600 mg

Hoe zijn Fluimucil 600 Bruis bruistabletten verpakt?

Fluimucil 600 Bruis is verpakt in een kartonnen doos met 6 bruistabletten.

Samenstelling

De werkzame stof in Fluimucil 600 Bruis is acetylcysteïne.

Fluimucil 600 Bruis bevat 600 mg acetylcysteïne per bruistablet.

Welke hulpstoffen bevat Fluimucil 600 Bruis?

Fluimucil 600 Bruis bevat natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur, aspartaam (E951) en citroensmaak als hulpstoffen.

Hoe werkt Fluimucil 600 Bruis?

Acetylcysteïne is een slijmoplossend middel en breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion.

Door wie wordt Fluimucil 600 Bruis op de markt gebracht?

In Nederland door:
Zambon Nederland B.V.
Basicweg 14B
3821 BR AMERSFOORT

Registratienummer

Fluimucil 600 Bruis, bruistabletten 600 mg is in het register ingeschreven onder RVG 25336=12151.

Waarvoor wordt Fluimucil 600 Bruis gebruikt?

Fluimucil 600 Bruis wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen om het ophoesten van taai slijm te vergemakkelijken zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Wanneer mag Fluimucil 600 Bruis niet worden gebruikt?

Bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne.
Bij fenyketonurie bij kinderen en zwangere vrouwen (fenyketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling).

Wanneer moet u voorzichtig zijn met het gebruik van Fluimucil 600 Bruis?

De bruistabletten van Fluimucil 600 Bruis zijn suikervrij. Diabetes patiënten kunnen Fluimucil 600 Bruis gebruiken. De bruistablet bevat aspartaam. Aspartaam wordt in

o.a. fenylalanine omgezet. Indien u fenylketonurie heeft moet u overleg plegen met uw arts of diëtist. Om overmatig gebruik van aspartaam te voorkomen kan uw voedingsvoorschrift worden aangepast.

Ook als u een maagzweer heeft moet u dit aan uw arts vertellen en met hem/haar overleggen of u Flumucil 600 Bruis kunt gebruiken.

Flumucil 600 Bruis met andere geneesmiddelen

Flumucil 600 Bruis mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Flumucil 600 Bruis tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Als u vermoedt of zeker weet dat u zwanger bent, vertel het de arts.

Hetzelfde geldt voor het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Flumucil 600 Bruis heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

De bruistablet oplossen in een half glas water door te roeren met een plastic lepel-tje. De oplossing moet direct worden opgedronken.

Bij het openen van de stripverpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. Dit heeft geen gevolgen.

Dosering

Volwassenen: 1 bruistablet per dag.

Verzwakte patiënten en bejaarden wordt aangeraden om de tablet 's morgens in te nemen.

Duur van de behandeling

Flumucil 600 Bruis mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder uw arts te raadplegen.

Overdosering met Flumucil 600 Bruis

Als u teveel bruistabletten heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken. De klachten zullen met name bestaan uit braken. Het is raadzaam om contact op te nemen met de arts.

Vergeten dosering

Wanneer u een of meerdere doseringen vergeten bent kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam om in dat geval uw normale gebruik te continueren. De vergeten medicatie niet alsnog innemen.

Welke bijwerkingen kan Flumucil 600 Bruis hebben?

Maag- of darmklachten kunnen voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken.

U wordt vriendelijk verzocht elke bijwerking welke niet in de bijsluiters wordt genoemd of als u een bijwerking als ernstig ervaart dit te melden aan uw arts of apotheker en Zambon Nederland B.V.

Hoe moet Flumucil 600 Bruis bewaard worden?

Geen speciale bewaar temperatuur vereist, bewaren in de originele verpakking.

Op het doosje en op de bruistablet kunt u na "Niet te gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Flumucil 600 Bruis na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Belangrijke tips

- Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.
- Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- Ga met vragen over uw geneesmiddel(en) altijd naar uw arts of apotheker.
- Overtuig u voor het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel neemt.
- Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
- Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken. Gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.