

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Fluimucil 200 Pastille zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Fluimucil 200 Pastille en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil 200 Pastille gebruikt.
 3. Hoe wordt Fluimucil 200 Pastille gebruikt?
 4. Mogelijke bijwerkingen.
 5. Hoe bewaart u Fluimucil 200 Pastille?

FLUIMUCIL[®] 200 PASTILLE
ZUIGTABLETTEN 200 MG

- Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne 200 mg per zuigtablet.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur (E330), sorbitol (E420), mannitol, macrogol 6000, crospovidon, natriumwaterstofcarbonaat, citroensmaak (bevat onder andere butylhydroxyanisole (E320)), mandarijnsmaak, aspartaam (E951), magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose (E460) en guar gum.

Registratiehouder: Zambon Nederland B.V.
Algolweg 9A
3821 BG Amersfoort

In het register ingeschreven onder RVG 28242=25408.

1. Wat is Fluimucil 200 Pastille en waarvoor wordt het gebruikt?

Samenstelling

Fluimucil 200 Pastille bevat 200 mg acetylcysteïne per zuigtablet.

Hoe werkt Fluimucil 200 Pastille?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is bovendien een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion. Glutathion vangt vrije radicalen weg die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en vrijkomen bij ontstekingsprocessen. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Hoe is Fluimucil 200 Pastille verpakt?

Fluimucil 200 Pastille is verpakt in doordrukstrips met 2 zuigtabletten. Een kartonnen doos bevat 20 of 30 zuigtabletten.

Waarvoor wordt Fluimucil 200 Pastille gebruikt?

Fluimucil 200 Pastille wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

2. Wat u moet weten voordat u Fluumucil 200 Pastille gebruikt

Gebruik Fluumucil 200 Pastille niet

- wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne.
- bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (fenylketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling).

Wees extra voorzichtig met Fluumucil 200 Pastille

- wanneer u een maagzweer heeft, omdat Fluumucil 200 Pastille uw maagwand kan irriteren.
- wanneer u fenylketonurie heeft. Dit produkt bevat aspartaam dat o.a. in fenylalanine wordt omgezet. Om overmatige inname van fenylalanine te voorkomen kan uw voedingsvoorschrift worden aangepast.
- aangezien dit product hydroxyanisole bevat. Hydroxyanisole irriteert de ogen, huid en slijmvliezen.
- aangezien dit product 220 mg sorbitol per zuigtablet bevat. De aanbevolen dagdosering levert 660 mg sorbitol bij volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar en 440 mg sorbitol bij kinderen van 2 tot 7 jaar. Sorbitol is niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie en kan ook maagdarmlaaten en diarree veroorzaken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Fluumucil 200 Pastille in combinatie met voedsel en drank

Fluumucil 200 Pastille kan met voedsel en drank worden gecombineerd.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Fluumucil 200 Pastille met andere geneesmiddelen

Fluumucil 200 Pastille mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Fluumucil 200 Pastille gebruikt?

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:

3 maal daags 1 zuigtablet

Kinderen van 2 tot 7 jaar:

2 maal daags 1 zuigtablet

Laat de zuigtablet in uw mond smelten, daarna pas doorslikken.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat Fluumucil 200 Pastille te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Gebruik dit produkt niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. Dit is normaal en onschadelijk.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Fluumucil 200 Pastille heeft gebruikt:

Klachten die kunnen voorkomen als gevolg van teveel tabletten zijn: braken.

Wanneer u teveel Fluumucil 200 Pastille heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Fluumucil 200 Pastille te gebruiken:

Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de “vergeten” dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals uw arts dat heeft voorgeschreven.

Neem nooit een dubbele dosis Fluumucil 200 Pastille om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluumucil 200 Pastille bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmklachten kunnen bij gebruik van Fluumucil 200 Pastille voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken. Bij patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad kan Fluumucil 200 Pastille een ongunstige werking hebben op het maagslijmvlies. Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Fluumucil 200 Pastille?

Fluumucil 200 Pastille buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Fluumucil 200 Pastille beneden 25 °C in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Fluumucil 200 Pastille niet meer na de datum op de verpakking achter “ niet te gebruiken na” of “exp”, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in februari 2003.