



Hyperisan®

Druppels

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Hyperisan® zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Hyperisan® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Hyperisan® gebruikt?
3. Hoe wordt A.Vogel Hyperisan® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Hyperisan®?

A.Vogel Hyperisan® druppels

De actieve bestanddelen zijn Achillea millefolium Ø 42%, Aesculus hippocastanum Ø 30%, Arnica montana Ø=D1 7%, Hypericum perforatum Ø 21%.

Alcoholgehalte ca. 65% v/v

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn niet aanwezig.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

Biohorma B.V.

Postbus 33
8080 AA Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met de A.Vogel Gezondheidslijn: 0900-2464646.

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 85405.

1. Wat is A.Vogel Hyperisan® en waarvoor wordt het gebruikt?

A.Vogel Hyperisan® is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij spataderen,

aambeien zonder bloedverlies, winterhanden en wintervoeten. De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 100 ml.

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Hyperisan® gebruikt?

Wanneer mag u A.Vogel Hyperisan® niet gebruiken

A.Vogel Hyperisan® mag niet gebruikt worden indien u ciclosporine gebruikt na een orgaantransplantatie of geneesmiddelen gebruikt tegen HIV infectie. Gebruik A.Vogel Hyperisan® ook niet in combinatie met antidepressiva en triptanen (antimigraine middelen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Hyperisan®

Gelijktijdig gebruik van A.Vogel Hyperisan® kan de effectiviteit van fenprocoumon, acenocoumarol, digoxine, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en theophylline verminderen. Vraag uw arts om advies omdat de dosering van deze geneesmiddelen aangepast dient te worden bij het begin of tot twee weken na beëindigen van het gebruik van A.Vogel Hyperisan®. Als u orale anticonceptiva ("de pil") gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd en kunnen doorbraak-bloedingen optreden. Daarom wordt aangeraden tijdens het gebruik van A.Vogel Hyperisan® en tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen te nemen



om de zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom).

Gebruik van A.Vogel Hyperisan® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Hyperisan® liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Hyperisan® tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 65% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Hyperisan® in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Bij gelijktijdig gebruik van A.Vogel Hyperisan® kan de afbraak van de onderstaande geneesmiddelen worden versneld waardoor hoeveelheden in het bloed verlaagd worden en de werkzaamheid verminderd: fenprocoumon, acenocoumarol, ciclosporine, digoxine, anti-HIV geneesmiddelen, orale anticonceptiva, carbamazepine, fenytoïne,

fenobarbital en theophylline. Neem contact op met uw arts indien u A.Vogel Hyperisan® in combinatie met één of meer van deze geneesmiddelen wilt gebruiken. Omdat A.Vogel Hyperisan® de werking van serotonine heropname-remmers zoals nefazodine, trazodon en triptanen (antimigraine middelen) zou kunnen beïnvloeden wordt gelijktijdig gebruik afgeraden.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

3. Hoe wordt A.Vogel Hyperisan® gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven *3x daags 5-10 druppels*, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Voor gebruik schudden

Omdat er tijdens bewaring enig bezinsel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.



Het flesje verticaal houden tijdens het druppelen.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Hyperisan® heeft ingenomen
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Hyperisan® heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Hyperisan® in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Hyperisan® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Hyperisan® wordt gestopt
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Hyperisan®?

A.Vogel Hyperisan® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Hyperisan® niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 1 juli 2002.

