

Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Madicure al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts, apotheker of drogist om uitleg als iets niet duidelijk is.

TRADEMARK

Madicure suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml

bs_nl_10_a

WAT IS MADICURE-SUSPENSIE?

Madicure-suspensie (hierna ook Madicure genoemd) bevat mebendazol (20 mg mebendazol per milliliter suspensie). Mebendazol is de stof die zorgt voor de werking van Madicure. Mebendazol is een stof die wormpjes doodt.

De suspensie is een witte, melkachtig uitzienende vloeistof met een bananensmaak.

Verder bevat Madicure hulpstoffen: saccharose, microkristallijne cellulose (E 460) en natriumcarmellose (E 466), methylcellulose (E 461), methylparahydroxybenzoaat (E 218), propylparahydroxybenzoaat (E 216), natriumlaurylsulfaat, bananensmaakstof, citroenzuur (E 330) en water.

Madicure-suspensie is verpakt in een bruin glazen flesje met 30 ml suspensie. De verpakking bevat verder een maatdopje. Een vol maatdopje bevat 5 ml Madicure-suspensie.

Madicure suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 10200 op naam van McNeil B.V., Postbus 90241, 5000 LV Tilburg.

WANNEER GEBRUIKT U MADICURE?

U gebruikt Madicure als u last heeft van een infectie met zogenaamde aarsmaden. Dit zijn ongeveer 1 cm lange witte wormpjes die in de darm leven. De wormpjes veroorzaken vaak jeuk aan of rondom de anus, vooral 's nachts of als u lang stil zit. U kunt de wormpjes soms als kleine witte draadjes in de ontlasting zien.

WANNEER MAG U MADICURE NIET GEBRUIKEN?

U mag Madicure niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de suspensie. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat is Madicure-suspensie?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, bultjes op de huid of vochtophoping rondom de mond, vooral lippen, keel en tong. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Madicure en raadpleeg uw arts.

Raadpleeg altijd uw arts als u twijfelt of u Madicure mag gebruiken.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

• Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Madicure tijdens de zwangerschap veilig is. Bent u in verwachting of wilt u in verwachting raken tijdens het gebruik van Madicure? Neem dan contact op met uw arts. Die vertelt u of u Madicure mag gebruiken.

• Borstvoeding

Madicure mag gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

• Kinderen

Bij kinderen jonger dan 2 jaar is er in verhouding tot oudere kinderen niet veel ervaring met het gebruik van Madicure. Neem daarom altijd eerst contact op met uw arts voordat u Madicure geeft aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.

• Gezinsbehandeling

Om te voorkomen dat gezinsleden elkaar weer besmetten, moeten alle gezinsleden de suspensie

innemen. Doet u dat niet, dan zou de (enige) behandelde persoon na de behandeling opnieuw besmet kunnen worden.

- **Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke**

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke, want Madicure vermindert het reactievermogen niet.

- **Extra informatie over bepaalde bestanddelen**

Madicure bevat propylparahydroxybenzoesaat (E 216) en methylparahydroxybenzoesaat (E 218). Deze stoffen kunnen allergische reacties opwekken.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN MADICURE

Gebruikt u ook nog andere geneesmiddelen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering).

Informeer uw arts of apotheker in elk geval als u naast Madicure medicijnen gebruikt tegen te veel maagzuur, die cimetidine bevatten.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

DOSERING VAN MADICURE

Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. Maak de kuur altijd helemaal af. Als u dit niet doet, dan heeft u kans dat de infectie niet helemaal weg gaat.

Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar

Neem één maatdopje met suspensie (dat is 5 ml). Neem na 14 dagen opnieuw één maatdopje suspensie in. Dit is nodig om helemaal van de infectie af te komen.

Als de worminfectie na een kuur nog niet over is, moet u contact opnemen met uw arts. Soms is het nodig een kuur te herhalen.

HOE MOET U MADICURE INNEMEN?

- Schud het flesje altijd goed voordat u het opent en de juiste hoeveelheid Madicure afmeet.
- Neem nooit zomaar een slok van de suspensie. Meet de hoeveelheid die u in moet nemen af met het bijbehorende maatdopje. Let op: de pijl aan de zijkant van de dop moet naar boven wijzen! Gewoonlijk is de dosering 5 ml, dus een vol maatdopje. Het maatdopje heeft 2 streepjes: één voor 2½ ml en één voor 5 ml.
- Neem Madicure onverdund in. Meng Madicure dus niet door een glas water, thee of limonade. Nadat u Madicure heeft ingenomen, kunt u om de smaak weg te spoelen, wel wat water, thee, melk of limonade drinken.
- U kunt Madicure 's ochtends, 's middags of 's avonds innemen. U kunt dit tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door doen.

Hoe moet u de fles openen?

De fles heeft een kindveilige dop.

U krijgt de fles als volgt open: druk de plastic schroefdop naar beneden en draai tegelijkertijd de dop tegen de richting van de klok in.



Hoe gebruikt u het maatdopje?

Gebruik het maatdopje zoals het op de fles zit. Zorg dat de kant met de maatverdeling (met de kleinste inhoud) naar boven is gericht; dat is de kant die u moet vullen. Als de pijl aan de zijkant naar boven wijst, is de goede kant boven.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering houdt in dat u of iemand in uw omgeving meer Madicure heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder Dosering van Madicure). De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden zijn maag-darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree. Raadpleeg in deze gevallen een arts.

Daarnaast kunt u altijd geactiveerde kool (verkrijgbaar in de apotheek of bij de drogist) (laten) innemen. Geactiveerde kool neemt de Madicure op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN MADICURE IN TE NEMEN?

Het is van groot belang dat de tweede dosis na 14 dagen wordt ingenomen. Gebeurt dat na meer dan 15 dagen, dan moet u na 14 dagen nog een dosis innemen. Raadpleeg in dat geval uw arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Madicure zijn de volgende bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- *bloed en lymfe*: tekort aan witte bloedlichaampjes wat gepaard gaat met verhoogde gevoeligheid voor infecties;
- *afweersysteem*: koorts (bij baby's), overgevoeligheid. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Madicure en raadpleeg uw arts;
- *zenuwstelsel*: stuipjes (bij baby's);
- *maag-darmkanaal*: buikpijn of diarree. Deze verschijnselen kunnen ook veroorzaakt worden door de worminfectie zelf;
- *lever en gal*: stoornissen in de werking van de lever (als u te lang te veel Madicure heeft ingenomen);
- *huid*: bij baby's: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme);
- *nieren en urinewegen*: nierontsteking (als u te lang te veel Madicure heeft ingenomen).

Neem contact op met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als er bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U MADICURE?

De juiste bewaarwijze is:

- in de originele verpakking (fles na gebruik goed sluiten);
- samen met deze gebruiksaanwijzing;
- niet boven 30 °C;
- niet in de koelkast of de vriezer;
- buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS MADICURE HOUDBAAR?

Als u Madicure op de juiste manier bewaart, is een ongeopend flesje houdbaar tot de datum die op de doos en/of op het flesje staat. Bijvoorbeeld: *niet gebruiken na 06-2008* of *EXP.: 06-2008* betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.

Als het flesje eenmaal open is geweest, dan is de suspensie nog hooguit zes maanden goed. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of drogist.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in juni 2005.

08 DEC 2005

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...

Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

- Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.*
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.*
- Gebruik het niet langer dan is aangegeven.*

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Madicure of over worminfecties?

Vragen over Madicure of over worminfecties kunt u het beste stellen aan uw drogist, arts of apotheker.

Voor vragen over Madicure kunt u ook contact opnemen met McNeil B.V.; e-mail:

scscquest@jacnl.jnj.com.