

Nectadyn® H

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nectadyn H zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Nectadyn H en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nectadyn H gebruikt.
3. Hoe wordt Nectadyn H gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nectadyn H?
6. Algemene informatie

De actieve bestanddelen voor 100 ml zijn: Baptisia tinctoria D6, Drosera rotundifolia D4, Hydrastis canadensis D6, Ipecacuanha D4, Rumex crispus D4, Sambucus nigra D4 telkens 4,8 ml

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol (6% v/v), Sirupus simplex, Acacia'honing.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

-Heel Belgium

9031 Drogen (Gent)

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel,

tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 93711.

1. Wat is Nectadyn H en waarvoor wordt het gebruikt?

Nectadyn H is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij hoesten.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Flacon met 125 ml of 250 ml siroop.

2. Wat u moet weten voordat u Nectadyn H gebruikt.

Wanneer mag u Nectadyn H niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Nectadyn H niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nectadyn H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Nectadyn H moet zijn.

Gebruik van Nectadyn H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik bij diabetes:

Diabetici mogen Nectadyn H hoestsiroop gebruiken; toch dienen zij rekening te houden met de aanwezigheid van gemiddeld 7,2 g koolhydraten (0,6 BE) per eetlepel, gemiddeld 4,8 g koolhydraten (0,4 BE) per dessertlepel en gemiddeld 2,4 g koolhydraten (0,2 BE) per koffielepel siroop (1 BE=12 g koolhydraten).

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Nectadyn H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Nectadyn H gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen: 3 tot 5x daags 1 eetlepel.

Kinderen van 3 tot 10 jaar: 3 tot 5x daags 1 dessertlepel

Kinderen van 6 maanden tot 3 jaar: 3 tot 5x daags 1 koffielepel.

Kinderen van 0 tot 6 maanden: Nectadyn H mag worden toegediend aan kinderen jonger dan 6 maanden oud, mits verdund met water of lauwe thee, maar niet met melk (veroorzaakt slijmvorming).

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nectadyn H heeft ingenomen:

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Nectadyn H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Nectadyn H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Nectadyn H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Nectadyn H?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en niet boven 25° C bewaren. Geopende verpakkingen koel bewaren. Bewaar Nectadyn H buiten bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Nectadyn H niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 08/2004.