



**Granulaat voor orale
suspensie 50 g**

50 g geactiveerde kool

Bij vergiftigingen

Vul de fles met water tot aan de rode streep (ongeveer 400 ml suspensie).

Voor oraal gebruik

Toepassing:

Bij acute orale vergiftigingen en overdosering van geneesmiddelen.

Niet te gebruiken:

Indien het zeker is dat de vergiftiging veroorzaakt is door etsende stoffen (b.v. sterke zuren zoals zoutzuur of basen zoals gootsteenontstopper).

Dosering:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: zo spoedig mogelijk 1-2 flessen via de mond toedienen (= 50-100 g geactiveerde kool). Kinderen tot 12 jaar: aanbevolen dosis: ongeveer 1 g geactiveerde kool per kg lichaamsgewicht. In geval van acute vergiftiging en overdosering bij kinderen beneden de 12 jaar een halve dosering (= 1/2 fles) via de mond toedienen; voor kinderen jonger dan 4 jaar een eerste dosis van 1/4 fles en dit enige malen herhalen in overleg met een arts. Bij herhaalde toediening de fles opnieuw goed schudden voor gebruik.

Bereiding suspensie:

- (1) Granulaat goed loskloppen.
- (2) Voeg aan de inhoud van de fles water toe tot de rode streep.
- (3) Schud krachtig gedurende 1 minuut. Hierdoor wordt ongeveer 400 ml suspensie verkregen.
- (4) Open de fles voorzichtig en gebruik de suspensie onmiddellijk.

Hulpstoffen: citroenzuurmonohydraat (E330), glycerol (E422) en Acacia gom (E415).

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur.

De klaargemaakte suspensie dient bij 2 °C - 8 °C (in de koelkast) bewaard te worden en is maximaal 3 dagen na bereiding houdbaar.

Registratiehouder: Norit N.V., Amersfoort.

RVG 16135

Chargennummer: zie onderkant verpakking.

Niet te gebruiken na: zie onderkant verpakking.

108-001/04-06