



## bij **Prikkelhoest**

Noscapinehydrochloride  
1 mg/ml stroop  
Samenwerkende Apothekers

**150 ml en 300 ml**

**Volwassenen en  
kinderen vanaf 3 jaar**



**Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er.**  
**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Noscapinehydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **In deze bijsluiter:**

1. Wat is Noscapinehydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Noscapinehydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers inneemt
3. Hoe wordt Noscapinehydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Noscapinehydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers
6. Aanvullende informatie

## 1 **Wat is Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers en waarvoor wordt het gebruikt**

### **Geneesmiddelengroep**

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

### **Gebruiken**

- Bij prikkelhoest.

## 2 **Wat u moet weten voordat u Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers inneemt**

**Gebruik Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers niet**

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers.

*Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.*

### **Wees extra voorzichtig met Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers**

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

### **Gebruik van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers met andere geneesmiddelen**

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers en andere (genees)middelen.

*Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.*

### **Zwangerschap en borstvoeding**

#### **Zwangerschap**

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

#### **Borstvoeding**

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

## Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmlaasten en diarree veroorzaken. Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

3

### Hoe wordt Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers ingenomen

Volg bij het gebruik van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

*De gebruikelijke dosering is:*

**Volwassenen:** 15 - 30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

**Kinderen van 6-12 jaar:** 15 ml 2 tot 4 maal per dag.

**Kinderen van 3-6 jaar:** 7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

*Als u merkt dat Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

*Wijze van gebruik*

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

*U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.*

### Wat u moet doen wanneer u meer van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

### Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers om zo de vergeten dosis in te halen.

4

### Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

**Afweersysteem:** Overgevoelighedsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

**Zenuwstelsel:** Sufheid, duizeligheid.

**Maag- en darmstelsel:** Misselijkheid.

*Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

5

### **Hoe bewaart u Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers?**

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

#### **Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.**

Gebruik Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

6

### **Aanvullende informatie**

#### **Wat bevat Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers**

- *Het werkzame bestanddeel is* noscapihydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- *Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn* citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

#### **Hoe ziet Noscapihydrochloride 1 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Flacon à 150 en 300 ml stroop.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Samenwerkende Apothekers Nederland bv  
Postbus 6612  
3002 AP Rotterdam

#### **Fabrikant**

Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5  
Postbus 552  
2003 RN Haarlem

#### **In het register ingeschreven onder:**

RVG 20550=16680, stroop 1 mg/ml.

Deze bijsluiters is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2008.