

Chefaro Nederland B.V.  
Postbus 6014, 3002 AA Rotterdam  
Telefoon: 010 - 2211007

# nourilax

**Maagsapresistente tabletten\***

**Samenstelling per tablet:**

5 mg bisacodyl als werkzaam bestanddeel en lactose, aardappelzetmeel, hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearaat (E572), talk (E553b), triethylcitraat en metacrylzuur copolymeer als hulpstoffen.

**Vorm en verpakkingsinhoud:**

30 maagsapresistente tabletten in doordrukstrips

**Fabrikant / registratiehouder:**

Chefaro Nederland BV  
Keileweg 8  
3029 BS Rotterdam  
Tel. 010-2211007

Nourilax is in het register ingeschreven onder RVG 01329.

**Werking:**

Nourilax is een laxeermiddel, waarvan de werking hoofdzakelijk berust op een direct contact van de werkzame stof met het darmslijmvlies. Op de nuchtere maag ingenomen werkt Nourilax gewoonlijk na 5 uur. Indien u Nourilax 's avonds inneemt dan werkt het na ongeveer 10 uur.

**Te gebruiken bij:**

Moeilijke stoelgang (obstipatie).

**Niet te gebruiken bij:**

Plotseling optredende buikpijn, darmafsluiting, ernstige uitdrogingsverschijnselen en overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

**Gebruik tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding:**

Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Nourilax gaat niet over in de moedermelk en kan zonder bezwaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

### **Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen:**

Niet gelijktijdig innemen met melk, zuiveringszout of andere middelen die bij brandend maagzuur worden gebruikt.

### **Waarschuwingen:**

Drink minimaal 1,5 tot 2 liter (6 tot 8 glazen) per dag. Indien na enkele dagen de ontlasting uitblijft of er treedt buikkramp op na gebruik van deze tabletten dan dient u uw arts te raadplegen. Langdurig gebruik kan de werking van de darm verminderen.

### **Dosering en wijze van gebruik:**

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 tot 2 tabletten per keer. Bij hardnekkige obstipatie maximaal 4 tabletten per dag.

Kinderen van 4-10 jaar: 1 tablet per keer. Bij hardnekkige obstipatie maximaal 2 tabletten per dag.

De tabletten heel met water innemen. De tabletten mogen niet langer dan 14 dagen achtereenvolgend worden gebruikt zonder overleg met uw arts.

### **Wat te doen indien er teveel wordt ingenomen:**

Indien meer is ingenomen dan wordt aanbevolen kan dit leiden tot diarree en buikkrampen en dient u contact op te nemen met een arts.

### **Bijwerkingen:**

In sommige gevallen treden buikkrampen en diarree op. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiters of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

### **Houdbaarheid:**

De tabletten zijn houdbaar tot de datum die op de zijkant van het doosje achter "Niet te gebruiken na" en op de strip achter "EXP" is vermeld. ("EXP" betekent hetzelfde als "Niet te gebruiken na")

Retourneer niet-gebruikte tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken aan uw apotheker.

### **Bewaren:**

Nourilax dient in de strip buiten bereik van kinderen bewaard te worden in een goed gesloten verpakking. Niet bewaren boven de 25°C.

### **Datum laatste herziening:**

Oktober 2000

Vermeld bij correspondentie het chargenummer dat op de zijkant van het kartonnen doosje en op de strip staat aangegeven.