

zetpillen 1000 mg

- hoofdpijn
- kiespijn
- spierpijn
- spit
- zenuwpijn
- menstruatiepijn
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na inenting

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar* zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
- Als de strip beschadigd of open is, dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, zie verder voor adresgegevens.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar* en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar* toedient?
3. Hoe wordt *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar* toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar*?

Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar

- Het werkzame bestanddeel is paracetamol.
- Het andere bestanddeel (hulpstof) is een vette zetpilbasis (adepts solidus).

Registratiehouder:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 757
3700 AT Zeist

In het register ingeschreven onder RVG 29787.

Panadol is a registered trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.

1. Wat is *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar* en waarvoor wordt het gebruikt?

- Panadol Zetpillen 1000 mg zijn witte, torpedovormige zetpillen.
- De zetpillen zijn verpakt in strips van elk 5 stuks. Een doosje bevat één of twee strips.
- Panadol Zetpillen 1000 mg behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben. Panadol Zetpillen 1000 mg wordt gebruikt bij:

2. Wat moet u weten voordat u *Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar* toedient?

Gebruik Panadol Zetpillen 1000 mg niet

- Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpil.
- Bij kinderen onder de 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Panadol Zetpillen 1000 mg

- Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
- Bij overmatig, langdurig alcoholgebruik (chronisch alcoholisme) dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt over een met 2 zetpillen Panadol Zetpillen 1000 mg).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven. Er is geen ervaring met langdurig gebruik tijdens de borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Panadol Zetpillen 1000 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken

Gebruik van Panadol Zetpillen 1000 mg in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Zetpillen 1000 mg is paracetamol.

- Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.
- Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (=geneesmiddel bij behandeling van AIDS) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
- Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een overdosering met paracetamol

ernstigere gevolgen hebben. Dit is ook het geval bij chronisch alcoholisme.

3. Hoe wordt Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar gebruikt?

Dosering

Als uw arts niet anders voorschrijft is de dosering als volgt:

leeftijd	lichaams- gewicht (kg)	dosis	aantal doses per dag
12 tot 15 jaar	40 tot 55	1 zetpil	2-3
volwassenen	-	1 zetpil	4

Het minst aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Breng de zetpil met de punt naar voren in de anus. Bevochtigen van de zetpil vergemakkelijkt het naar binnen glijden.

- Tussen twee toedieningen dient minstens 6 uur te liggen.
- Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
- De aangegeven dosering niet overschrijden.
- Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Panadol Zetpillen 1000 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Zetpillen 1000 mg heeft toegediend

Wanneer u teveel van Panadol Zetpillen 1000 mg heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij toediening van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal toedienen van enkele malen de dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Zetpillen 1000 mg toe te dienen

Dien nooit twee zetpillen van Panadol Zetpillen 1000 mg toe om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Zetpillen 1000 mg wordt gestopt

Het gebruik van Panadol Zetpillen 1000 mg kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Zetpillen 1000 mg bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwer-

kingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed: zelden (0,1% of minder, maar meer dan 0,01%): veranderingen in het bloed (agranulocytose) (na langdurig gebruik), dit is te merken aan onder andere koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus. Treedt deze bijwerking op, neem onmiddellijk contact op met uw arts. Bloeduitstortingen als gevolg van verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede.

Afweersysteem: allergische reacties, voornamelijk huiduitslag (met ernstige jeuk), galbulten en koorts.

Lever of gal: leverfalen en acute leverontsteking. Na inname van normale of hoge doses kan leverbeschadiging optreden.

Huid: ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts (exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolysis) zijn gemeld. Treedt één van deze bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van paracetamol en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.

Nieren en urinewegen: bepaalde aandoeningen van de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar?

- Panadol Zetpillen 1000 mg buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Panadol Zetpillen 1000 mg niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" (dit staat op het doosje) of "Exp" (dit staat op de strip).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2010.