



### Samenstelling

Prioderm<sup>®</sup> shampoo bevat 10 mg/g malathion, een middel werkzaam tegen luizen en neten (eitjes).

Hulpstoffen: cetostearyl alcohol, lauryldiethanolamide, geëthoxyeerde lanoline, methylhydroxybenzoesaat, propylhydroxybenzoesaat, natriumlaurylsulfaat, zoutzuur, dinatriumfosfaat, citroenzuur, dinatriumedetaat, E110 en parfum.

### Eigenschappen

Prioderm<sup>®</sup> shampoo doodt luizen en neten. Resistentie van hoofdluis voor malathion is tot op heden niet waargenomen.

### Afleveringsvorm

Tube met 40 gram crème à 10 mg/g malathion.

### Registratiehouder

Meda Pharma B.V.  
Postbus 167  
1180 AD Amstelveen

Licentie: MUNDIPHARMA AG, Bazel/Zwitserland

**MEDA**

In het register ingeschreven onder RVG 07453.

### Te gebruiken bij

1. Besmetting met hoofdluis van het hoofdhaar, vooral op achterhoofd en achter de oorschelpen.
2. Besmetting met schaam-, krab- of platluis van pubishaar, haar tussen benen en rond de anus en soms haar van de oksels.

### Niet te gebruiken door

Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Prioderm<sup>®</sup> shampoo.

### Waarschuwingen en voorzorgen

Prioderm<sup>®</sup> shampoo uitsluitend uitwendig gebruiken.

Vermijd tijdens de behandeling contact met de ogen. Een doekje over de ogen is wenselijk.

Tijdens de behandeling met Prioderm<sup>®</sup> shampoo dient te worden vermeden dat shampoo in het oor terecht komt, daar bij beschadigde of ontstoken trommelvliezen schade aan het oor (gehoorverlies) kan optreden.

Contact met beschadigde of eczematieuze huid dient eveneens te worden vermeden. Besmette kleding, haarkammen, stoelleuning e.d. grondig reinigen.

Na de behandeling met Prioderm<sup>®</sup> shampoo mag het nog vochtige haar niet worden afgedekt. Dit ter voorkoming van opname van een deel van de werkzame substantie door de (hoofd)huid. Het is raadzaam de behandeling 2-3 uur of langer voor het naar bed gaan te verrichten.

Het wassen met water en een gewone shampoo van het haar binnen 12 uur na de behandeling met Prioderm<sup>®</sup> shampoo is niet gewenst.

Gelijktijdige behandeling met Prioderm<sup>®</sup> van contactpersonen (in het gezin, school enz.) is belangrijk om herbesmetting te voorkomen.

Het is raadzaam dat verpleegkundigen die meerdere personen behandelen, handschoenen dragen.

Kinderen jonger dan 6 maanden dienen behandeld te worden onder medisch toezicht.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

### Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere vormen van wisselwerking

Chloor inactieveert malathion. Behandelde personen wordt derhalve ontraden tot 1 week na behandeling te zwemmen in chloorhoudend badwater.

### Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding

Over het gebruik van malathion in de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap uitsluitend te gebruiken na overleg met uw arts. Het is aangetoond bij dieren dat malathion in de moedermelk overgaat, derhalve mag Prioderm<sup>®</sup> niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

### Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Op grond van de wijze van toediening kan geen invloed worden verwacht.

### Dosering en wijze van gebruik

Een tube is voldoende voor circa 10 behandelingen.

Voor een effectieve behandeling dienen de onderstaande instructies nauwkeurig te worden opgevolgd. Indien met de shampoo onvoldoende effect wordt verkregen, kan worden overgeschakeld op de lotion.

Bij een besmetting met hoofdluis wordt het haar nat gemaakt met warm water. Knijp ongeveer 5 cm crème uit de tube op de open hand, breng dit op de hoofdhuid, masseer de gehele hoofdhuid hier goed mee in en was het haar totdat schuim ontstaat. Wrijf vooral achter de oorschelpen en in de nek.

Houdt dan 4-5 minuten pauze en spoel grondig na met alleen water (**niet** met gewone shampoo). Herhaal direct daarna deze behandeling nog een keer. Kam het natte haar daarna met een fijne metalen stofkam of speciale luizenkam goed uit om de dode luizen en /of neten te verwijderen. Een week later dient de behandeling op dezelfde wijze te worden herhaald, tenzij bij grondige inspectie blijkt, dat geen actieve luizen en / of neten meer aanwezig zijn.

Bij een besmetting met platluis wordt Prioderm® shampoo op dezelfde wijze als boven beschreven gebruikt voor het wassen en masseren van het haar van de pubisstreek, van de binnenzijde van de bovenbenen en de perianale streek. Vervolgens de instructies zoals bij hoofdluis nauwkeurig volgen.

In geval van een etterige huidontsteking als gevolg van een secundaire bacteriële infectie door krabben, kan Prioderm® shampoo zonder bezwaar worden toegepast alvorens de huidaandoening wordt behandeld.

### **Verschijnselen bij en behandeling van overdosering**

Mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Prioderm® via de mond binnen hebben gekregen, dan zijn op grond van het onderzoek bij dieren de volgende vergiftigingsverschijnselen te verwachten:

- sterk verhoogde speekselafscheiding;
- sterk verhoogde traanvochtscheiding;
- bemoeilijkte ademhaling, trillingen, diarree, verkrampingen en tenslotte coma.

De behandeling van deze vergiftiging bestaat uit het toedienen van een braakmiddel of uit een maagspoeling en opname in het ziekenhuis. Er mag **geen** melk, ricinusolie of vloeibare paraffine worden toegediend, omdat de absorptie van malathion hierdoor wordt bevorderd.

### **Bijwerkingen**

Personen die veel last hebben van roos, vertonen na de behandeling met malathion soms een tijdelijke toename ervan.

Overgevoeligheidsverschijnselen kunnen optreden.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

### **Bewaring en houdbaarheid**

Droog en op een koele plaats (8 - 20°C) bewaren.

Dit geneesmiddel buiten bereik van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking (maand/jaar).