

Prrrikgweg® gel

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door; want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopatisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van uw arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Prrrikgweg gel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Prrrikgweg gel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Prrrikgweg gel gebruikt
3. Hoe wordt Prrrikgweg gel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Prrrikgweg gel?
6. Algemene informatie

Prrrikgweg® gel

Per 100 g bevat Prrrikgweg gel de werkzame bestanddelen: 3 g Echinacea pallida oertinctuur; 5 g Ledum palustre oertinctuur en 2 g Urtica urens oertinctuur.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: alcohol, hamamelidis water, carbomeer, citronella olie, eucalyptus olie, methylparabeen (E218), natrium EDTA, vloeibare paraffine en triethanolamine.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopathielijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-90111).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 80008.

1. Wat is Prrrikgweg gel en waarvoor wordt het gebruikt?

Prrrikgweg gel is een homeopatisch geneesmiddel, dat wordt toegepast bij insectensteken, kwallenbeten en huidirritatie ten gevolge van brandnetels.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Verpakking

Prrrikgweg gel wordt verpakt in een tube met een inhoud van 25 gram, voorzien van een schroefdop.

2. Wat u moet weten voordat u Prrrikgweg gel gebruikt.

Wanneer mag u Prrrikgweg gel niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij Prrrikgweg gel niet gebruikt mag worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Prrrikgweg gel?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Prrrikgweg gel moet zijn.

Gebruik van Prrrikgweg gel in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Prrrikgweg gel in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Prrrikgweg gel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt, tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Prrrikgweg gel bij de

aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Prrrikgweg gel

In een enkel geval kan een overgevoeligheidsreactie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Prrrikgweg gel te gebruiken.

Gebruik van Prrrikgweg gel in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Prrrikgweg gel gebruikt?

Prrrikgweg gel is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. De tube kan met behulp van de punt in de dop worden geopend. Prrrikgweg gel in een dunne laag op de huid aanbrengen en laten intrekken. Naar behoefte herhalen. De gesmeerde huid kan afgedekt worden om vlekken in kleding te voorkomen.

Indien binnen 3 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten verergeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen. In geval van



overgevoeligheid voor bijen- of wespengif dient u na een beet direct medische hulp in te roepen.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Prriikweg gel heeft gebruikt?

Overmatige dermale toepassing kan leiden tot een verergerde huidirritatie. Indien de verergerde huidirritatie niet binnen een week na het stoppen van het gebruik over is, dient u contact met uw arts op te nemen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Prriikweg gel wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoelheidsreactie voordoen in de vorm van een verergerde huidirritatie (jeukende huiduitslag, roodheid). Deze verergerde verschijnselen verdwijnen gewoonlijk als het gebruik wordt gestaakt. Indien de verergerde huidirritatie niet binnen een week na het stoppen van de behandeling over is, wordt geadviseerd uw arts te raadplegen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Prriikweg gel (nogmaals) te gebruiken.

5. Hoe bewaart u Prriikweg gel?

Prriikweg gel buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op de tube. U vindt de datum op het doosje en de tube na of onder de woorden "Niet te gebr. na:" (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

6. Algemene informatie

Kenmerkend voor de klachten bij het homeopathisch geneesmiddelbeeld van de bestanddelen van Prriikweg gel zijn irritaties van de huid die gepaard gaan met roodheid en jeuk. Prriikweg gel vermindert de zwelling van de huid na een steek of beet en stilt de jeuk.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 26 november 2004.

P
rriikweg®
gel

**Homeopathisch
geneesmiddel bij
insectenbeten**



E00671-1.0-W
230336600

©VSM

25 g