



STROOP

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om STODAL zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te raadplegen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Stodal en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Stodal gebruikt.
3. Hoe wordt Stodal ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Stodal stroop?

Stodal, stroop

De actieve bestanddelen zijn Pulsatilla vulgaris 6 CH, Rumex crispus 6 CH, Bryonia alba 3 CH, Ipecacuanha 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Sticta pulmonaria 3 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Coccus cacti 3 CH, Drosera rotundifolia TM.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn karamel (E150a), benzoëzuur, ethanol, sucrose, water.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Frankrijk.

Voor inlichtingen en informatie:

KERNPHARM B.V.
Postbus 26 - 5460 AA Veghel
0800-0997773 (gratis).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 81810.

1. WAT IS STODAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Stodal is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij hoest. De werkzaamheid van dit homeopathisch middel is door het college ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

De stroop is verpakt in een doos met een fles van 200 ml.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U STODAL GEBRUIKT

Wanneer mag u STODAL niet gebruiken ?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Stodal niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met STODAL ?

Er zijn geen omstandigheden bekend waar- bij u extra voorzichtig met Stodal moet zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar overeenkomstig de aanbe- volen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit genees- middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van STODAL

Dit geneesmiddel bevat per 100 gram 60 gram sucrose.

Bij gebruik van de aanbevolen dagdose- ring, levert elke dosis 11,25 g sucrose.

Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom, of sucrose-isomaltase deficiëntie. Kan maagdarmlaatsen en diarree veroor- zaken. 15 ml Stodal bevat 11,25 g sucrose en 0,2 g ethanol; 5 ml Stodal bevat 3,75 g sucrose en 0,065 g ethanol.

Gebruik van STODAL in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker indien u momenteel medicijnen slikt of recentelijk enig ander medicijn heeft geslikt, ook indien niet voorgeschreven.

3. HOE WORDT STODAL INGENOMEN?

Dosering

- Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 3 tot 5 maal daags 15 ml, dit komt overeen met 9 tot 15 maatlepels per dag.
- Kinderen van 2 tot 12 jaar: 3 tot 5 maal daags 5 ml, dit komt overeen met 3 tot 5 maatlepels per dag.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van STODAL heeft ingenomen

Wanneer u teveel Stodal heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent STODAL in te nemen

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Stodal in te nemen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met STODAL wordt beëindigd

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwer- kingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U STODAL ?

Stodal buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Stodal niet meer na de datum op de verpakking achter: "niet te gebruiken na"

Deze bijsluiter is voor het laatst goedge- keurd in juli 2002.