

Informatie voor de patiënt

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Aspirine-C al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts, apotheker of drogist. Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.



ASPIRINE-C

bruistablet

Samenstelling

Aspirine-C bevat als *werkzame stoffen* per bruistablet 400 mg acetylsalicylzuur (acetosal; met buffer) en 240 mg ascorbinezuur (vitamine C).

Verder bevatten de bruistabletten de volgende *hulpstoffen*: natriumcitraat, natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur en natriumcarbonaat.

De bruistabletten zijn wit en vlak, en aan één zijde van het Bayerkruis voorzien.

Verpakkingen

Aspirine-C is verkrijgbaar in een verpakking met 10 bruistabletten (5 strips met elk 2 bruistabletten).

Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, tel. 0297-280666.

Aspirine-C is in het register ingeschreven onder RVG 06303.

Waarvoor wordt Aspirine-C gebruikt?

Werking

Aspirine-C bruistabletten bevatten als *werkzame stof* acetylsalicylzuur. Acetylsalicylzuur heeft een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking.

Toepassing

Aspirine-C kan worden gebruikt bij

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- hoofdpijn
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn
- reumatische pijn.

Wat moet u weten voordat u Aspirine-C gebruikt?

Gebruik Aspirine-C niet:

- maagpatiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
- patiënten met een maag-/darmzweer
- patiënten met maag-/darmlbloedingen
- patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of andere soortgelijke pijnstillers (b.v. sommige astma-patiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
- patiënten met leveraandoeningen
- patiënten met ernstige nierklachten
- patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie of hypotrombinemie)
- patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld
- patiënten met een natriumbepert (zoutarm) dieet
- patiënten met neiging tot vorming van stenen in de urinewegen.

Als u denkt dat één van de bovengenoemde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Wees extra voorzichtig met Aspirine-C:

- veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen
- gebruik geen acetylsalicylzuur vóór of na het trekken van tanden of kiezen
- neem geen acetylsalicylzuur in kort vóór of kort na gebruik van alcohol
- bij kinderen met waterpokken of griep mag acetylsalicylzuur alleen op advies van de arts worden toegepast
- bij een natriumbepert dieet; één bruistablet bevat 502 mg natrium, wat bij dit dieet schadelijk kan zijn.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt

Als u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Raadpleeg daarom uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt:

- bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen) kan de neiging tot bloedingen toenemen.

Bij gebruik van hoge doseringen kan vanwege de aanwezigheid van ascorbinezuur de bepaling van glucose in de urine worden gestoord.

Gebruik van Aspirine®-C samen met drank

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur met alcohol is de kans op maagklachten groter.

Bij zwangerschap

- acetylsalicylzuur mag in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts worden gebruikt.
- acetylsalicylzuur mag niet worden gebruikt gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Bij borstvoeding

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines

Invloed op de rijvaardigheid of het bedienen van machines valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening te worden gehouden.

Hoe moet Aspirine®-C worden gebruikt?

Dosering

- **Volwassenen:** 1 of 2 bruistabletten per keer, maximaal 10 bruistabletten (= 4000 mg) per 24 uur, verdeeld over 4 of meer giften.

- **Kinderen van 14-15 jaar:** 1 bruistablet per keer; maximaal 5 bruistabletten (= 2000 mg) per 24 uur.

- **Kinderen van 12-13 jaar:** 1 bruistablet per keer; maximaal 4 bruistabletten (= 1600 mg) per 24 uur.

De tijd tussen twee innames moet bij kinderen minstens 4 uur bedragen.

Wanneer de klachten (koorts en pijn) weer opkomen, is herhaalde toediening toegestaan, maar de maximale dosering (volwassenen: 4000 mg per dag, kinderen 12 jaar en ouder: 1600-2000 mg per dag) mag niet worden overschreden.

Duur van de behandeling

U mag Aspirine niet langer dan 14 dagen aaneen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Gebruiksaanwijzing

- De bruistabletten oplossen in een glas water en de oplossing opdrinken.
- Indien een snel effect gewenst is, verdient toediening op de nuchtere maag of tenminste een half uur vóór de maaltijd de voorkeur.
- Wanneer maagklachten optreden, dienen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd te worden ingenomen.

Wat moet u doen wanneer u teveel Aspirine®-C hebt ingenomen?

Bij een matige overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, overgeven, maagpijn en diarree.

Bij een ernstige overdosering treden op: hyperventilatie, transpireren, oorsuizen, onrust, hallucinaties en spierkrampen; in zeer ernstige gevallen treedt bewusteloosheid op en kan ademstilstand ontstaan.

Indien een te hoge dosis is ingenomen en er zich tekenen van overdosering voordoen, dient de arts te worden geraadpleegd. Deze oordeelt of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Aspirine®-C?

Aspirine®-C kan zoals alle geneesmiddelen bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- maagklachten (dan gebruik stoppen)
- bloedverlies in het maagdarmlkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
- overgevoeligheidsverschijnselen
- verlenging van de bloedingsstijd.

Hogere doses kunnen vanwege de aanwezigheid van ascorbinezuur misselijkheid, diarree en bij langdurig gebruik nierstenen veroorzaken.

Als u vermoedt dat er een bijwerking optreedt die hierboven niet is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Aspirine®-C bewaren?

- Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!
- Niet boven 25°C bewaren.
- Gebruik geen tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld (achter 'Niet te gebruiken na:') en op de strip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date, Engels voor vervaldatum. Breng tabletten waarvan de vervaldatum verstreken is naar de apotheek. De tabletten zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst aangepast in:
December 2002

Bayer

01253250