

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Corsodyl tandgel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Corsodyl Tandgel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

- Corsodyl tandgel bevat chloorhexidine digluconaat. Chloorhexidine digluconaat heeft een bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste bacteriesoorten.
- Corsodyl tandgel voorkomt het ontstaan van tandplak en kan reeds bestaande tandplak gedeeltelijk doen verdwijnen.
- Corsodyl tandgel wordt gebruikt:
 - Ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen.
 - Voor kortdurende toepassing bij tandvleesontsteking.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dient Corsodyl tandgel niet te worden doorgeslikt en niet te worden toegediend aan kleine kinderen.
- Nergens anders dan in de mond gebruiken. Indien Corsodyl tandgel in de ogen of oren terecht komt, direct uitspoelen met veel water.
- Corsodyl tandgel vervangt de gewone tandpasta niet.
- Sommige tandpasta's kunnen de werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl tandgel, nadelig beïnvloeden. Spoel de mond na het tandenpoetsen zeer goed na met water om tandpastaresten te verwijderen en wacht 5 minuten voordat u Corsodyl tandgel gebruikt. U kunt Corsodyl tandgel ook op een ander tijdstip van de

dag gebruiken. Tevens is het raadzaam voor Corsodyl tandgel een tandenborstel te gebruiken die niet voor tandpasta is gebruikt.

- Stop het gebruik van de tandgel en raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u last krijgt van pijn of irritatie van de mond.
- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Kinderen

Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar tenzij geadviseerd door een arts of apotheker.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Corsodyl tandgel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook "mogelijke bijwerkingen"). Om tandverkleuring te vermijden kunt u het gebruik van kleurvormende stoffen verminderen en kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met een kunstgebitreiniger direct vóór het gebruik van Corsodyl tandgel overwogen worden. Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Corsodyl tandgel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Corsodyl tandgel heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tanden borstelen met ongeveer 2,5 cm gel op een bevochtigde tandenborstel, twee keer per dag gedurende 15 dagen of volgens het advies van de (tand)arts.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Na inname zal chloorhexidine digluconaat nauwelijks worden opgenomen in het lichaam.

Effecten op het lichaam zullen beperkt blijven tot lichte irritatie van de slijmvliezen, mogelijk misselijkheid en braken. Wij adviseren u bij lichamelijke klachten of bij inname van grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik, zodra u merkt dat u vergeten bent Corsodyl tandgel te gebruiken, Corsodyl tandgel alsnog en ga verder met de behandeling zoals beschreven in "Hoe gebruikt u dit middel?"

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Geen bijzonderheden.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen:

- Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u huiduitslag, zwelling van de lippen, tong, keel of gezicht krijgt of moeite heeft met ademen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie die zeer zeldzaam is.

Zenuwstelselaandoeningen:

- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Maagdarmsstelselaandoeningen:

- Huidirritatie
- Bruine verkleuring van de tong en tanden. Zie bij "waarop moet u letten met eten en drinken" hoe u dit kunt vermijden.
- Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies.
- Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen verdween deze nadat de toepassing was gestopt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket van de tube na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is chloorhexidine digluconaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), isopropylalcohol, natrium acetaat, hydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

Hoe ziet Corsodyl tandgel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Corsodyl tandgel is een vloeibare, heldere, kleurloze gel. Corsodyl tandgel is verpakt in een tube van 50 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder;
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist

Fabrikant;

BCM Limited,
Thane Road, Nottingham,
Nottinghamshire NG 2 3AA,
Verenigd Koninkrijk

Purna Pharmaceuticals NV,
Rijksweg 17,
2870 Puurs,
België.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2016.