

BIJSLUITER

Dettol Med Chloorxylenol
48 mg/g, concentraat voor
oplossing voor cutaan
gebruik

Chloorxylenol

Lees de hele bijsluiters zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder
voorschrift verkregen
worden. Desondanks moet u
Dettol Med Chloorxylenol 48
mg/g zorgvuldig gebruiken
om een goed resultaat te
bereiken.

- Bewaar deze bijsluiters. Het
kan nodig zijn om deze
nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen,
raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
- Raadpleeg een arts, als
uw verschijnselen
verergeren of niet
verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de
bijwerkingen ernstig wordt
of als er bij u een
bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiters is
vermeld, raadpleeg dan
uw arts of apotheker.

In deze bijsluiters:

1. Wat is Dettol Med
Chloorxylenol 48 mg/g en
waarvoor wordt het
gebruikt
2. Wat u moet weten

voordat u Dettol Med
Chloorxylenol 48 mg/g
gebruikt

3. Hoe wordt Dettol Med
Chloorxylenol 48 mg/g
gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dettol
Med Chloorxylenol
48 mg/g
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Dettol Med Chloorxylenol
48 mg/g geeft na
verdunnen met water een
melkachtige oplossing. De
verdunde oplossing wordt
gebruikt voor antiseptische
reiniging van snijwonden,
beten, schaafwonden en
insectenbeten.

Dettol Med Chloorxylenol
48 mg/g is een
geconcentreerde
oplossing en dient te
worden verdund vóór
gebruik.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G GEBRUIKT

**Gebruik Dettol Med
Chloorxylenol 48 mg/g
niet**

- als u eczeem heeft
- als u allergisch
(overgevoelig) bent voor

Chloorxylenol of een van
de andere
bestanddelen van Dettol
Med Chloorxylenol
48 mg/g

Niet gebruiken rond de
ogen, oren, neus of mond.

Wees extra voorzichtig met Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g

Bij inslikken de mond
spoelen en veel water of
melk drinken.

Bij contact met de ogen,
de ogen goed spoelen
met koud water.

In beide gevallen wordt
aanbevolen om een arts te
raadplegen.

Indien de oplossing
onverdund wordt gebruikt,
moet u de huid goed
wassen en een arts
raadplegen wanneer
huidreacties optreden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen specifieke
studies uitgevoerd. Het is
daarom niet aanbevolen
Dettol Med Chloorxylenol
48 mg/g gelijktijdig met
andere uitwendige
geneesmiddelen te
gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit product niet als
u zwanger bent of

borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dettol Med Chloorxylenol
48 mg/g heeft geen
invloed op rijvaardigheid
en het vermogen om
machines te bedienen.

3. HOE WORDT DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G GEBRUIKT

Dit geneesmiddel is
bestemd voor uitwendig
gebruik.

Wonden, beten,
schrammen en
insectenbeten: Verdun
50 ml Dettol Med
Chloorxylenol 48 mg/g met
water tot 1 liter (1:20) en
was de zone met deze
verdunde oplossing.
Afdekken met droog gaas
of met watten opgevuld
verband.

Dettol Med Chloorxylenol
48 mg/g kan worden
gebruikt bij volwassenen en
kinderen vanaf
12 maanden.

Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen
kan Dettol Med
Chloorxylenol 48 mg/g
bijwerkingen veroorzaken,
hoewel niet iedereen deze

bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen zijn zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 personen). Huidreacties kunnen optreden zoals irritatie, huiduitslag, afsterving van de huid, kloven op plaats van aanbrengen, ontsteking, huidontkleuring, jeuk, huidafschilfering en een brandend gevoel. Haarverlies werd ook gerapporteerd. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities. De oplossing dient direct na verdunning te worden gebruikt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g

- Het werkzame bestanddeel is Chloorxylenol 48 mg/g
- De andere bestanddelen zijn: dennenolie, isopropylalcohol, ricinusolie, karamel (E150(c)) en zuiver water.

Hoe ziet Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een helder, geelbruine concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik. De verdunde oplossing heeft een melkachtig witte kleur. Het wordt verpakt in flacons van 125, 250, 500, 750, 1000 en 1250 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is ingeschreven onder RVG 34838

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

Fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd,
Dansom Lane
Hull, HU8 7DS
East Yorkshire
Groot-Brittannië

Deze bijsluiters is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2014.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g wordt gebruikt voor: desinfectie van snijwonden, beten, schaafwonden en insectenbeten.

Dosering en wijze van gebruik

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g moet als volgt verdund worden voordat het gebruikt wordt:

50 ml Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g aanvullen tot 1 liter met water (5% oplossing). De verdunde Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g voorzichtig aanbrengen, bijvoorbeeld door een gaasje gedrenkt in de verdunde oplossing aan te brengen op de te desinfecteren plaats.

Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet: bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen; en bij eczematuze aandoeningen.

Hulpstoffen: pijnboomolie, isopropylalcohol, castorolie, karamel (E150 (c)) en water.

Lees voor gebruik de bijsluiters.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE B.V.
Siriusdreef 14,
2132 WT
Hoofddorp
RVG 34838
UAD



3031807