

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER

### Nestosyl, hydrofobe crème

Pramocaïne hydrochloride 10 mg/g,  
zinkoxide 100 mg/g

### Lees goed de hele bijsluitervoor dat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u:

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluitervoor. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluitervoor staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Inhoud van deze bijsluitervoor

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

## 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Pramocaïne hydrochloride werkt lokaal pijn- en jeukstillend. Zinkoxide heeft een dekkende, verkoelende en zwak adstringerende (= samentrekkende) werking. Samenvattend werkt Nestosyl pijn- en jeukverlichtend.

Nestosyl kan worden gebruikt ter verlichting van plaatselijke jeuk, insectenbeten en oppervlakkige schaafwonden.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

## 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

### Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Nestosyl is niet geschikt voor toepassing op slijmvlieszen. Langdurige toepassing op grote huidoppervlakken moeten worden vermeden. Bij grove overdosering bestaat de mogelijkheid van ernstige systemische bijwerkingen ten gevolge van absorptie van pramocaïne. Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren uw arts raadplegen. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U bent allergisch voor pramocaïne, zinkoxide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

## Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens borstvoeding.

## Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beïnvloeding van deze functies valt niet te verwachten.

## Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nestosyl

Nestosyl bevat arachide-olie (pinda-olie), soja-lecitine en wolvet.

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor pinda's en/of soja. Wolvet kan plaatselijke huidirritaties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

## 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op de beschadigde huid brengt men een dikke laag Nestosyl crème aan. Vervolgens wordt de betreffende plek – zo nodig – afgedekt met verbandgaas of een pleister. Deze behandeling wordt één- à tweemaal per dag herhaald. Bij plaatselijke kortdurende jeuk of insectenbeten brengt men enige malen per dag een dunne laag crème aan.

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

##### **Huid- en onderhuidaandoeningen.**

Frequentie: niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Contactallergie of irritatie door pramocaïne, een van de conserveermiddelen of andere bestanddelen van de basis kan voorkomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaars Nestosyl beneden 25 °C. Op deze wijze bewaard is Nestosyl houdbaar tot en met de op de verpakking aangegeven datum. De datum staat op de verpakking en de tube aangegeven achter de woorden "niet te gebruiken na" en in de zoom van de tube onder de afkorting: "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

#### 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

##### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stoffen in dit middel zijn:

pramocaïne en zinkoxide

De andere stoffen in dit middel zijn:

Benzalkoniumbromide (als conserveermiddel), 8-hydroxychinoline (als conserveermiddel), Wolvet, witte vaseline, arachide-olie, soja-lecitine

##### **Hoe ziet Nestosyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Nestosyl is verpakt in een aluminium tube van 15 of 30 gram. De tube is verpakt in een kartonnen doosje.

##### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7949 AK Rogat

Fabrikant:  
Qualiphar NV  
Rijksweg 9  
B-2880 Bornem  
België

In het register ingeschreven  
onder RVG 00591

**Deze bijsluiter is goedgekeurd  
in januari 2013.**