



Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u Reduflux™ vloeibare sachets gebruikt en bewaar deze zorgvuldig, het bevat belangrijke informatie. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer informatie of advies wilt of wanneer u na inname van Reduflux™ vloeibare sachets ongewone bijwerkingen ervaart.

## 1. Waar worden Reduflux™ vloeibare sachets voor gebruikt

Reduflux™ vloeibare sachets bieden effectief snelle werking en langdurige verlichting tegen de pijn en het ongemak van brandend maagzuur en zure oprispingen, die zich bijvoorbeeld na de maaltijd of tijdens de zwangerschap en bij patiënten die last hebben van symptomen die verband houden met refluxoesofagitis kunnen voordoen. De vloeibare sachets beginnen vanaf enkele minuten na inname te werken en bieden tot wel 4 uur verlichting. Reduflux™ vloeibare sachets bevatten een natuurlijke refluxonderdrukker die een sterke beschermende laag vormt boven de maaginhoud om te voorkomen dat maagzuur ontsnapt naar de slokdarm, waar het pijn doet.

## 2. Wat zijn Reduflux™ vloeibare sachets

Vloeistof met pepermuntsmak in een handige sachet, direct in te nemen, eenvoudig dagelijks en onderweg te gebruiken. Reduflux™ vloeibare sachets bevatten als actief ingrediënt Phycodol™, een extract uit bruine algen. De vloeibare sachets bevatten ook natriumbicarbonaat en calciumcarbonaat. Hulpstoffen zijn: carbomeer, saccharinenatrium, natriummethylparahydroxybenzoaat, natriumpropylparahydroxybenzoaat, pepermuntolie, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Reduflux™ vloeibare sachets bevatten geen suiker.

## 3. Hoe gebruikt u Reduflux™ vloeibare sachets

- Vloeibare sachets voor orale inname.
- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: wanneer de symptomen zich voordoen, neem 1 tot 2 vloeibare sachets na de maaltijden of vóór het slapengaan.
- Kinderen jonger dan 12 jaar: alleen innemen na medisch advies.
- Leeg de gehele inhoud van de sachet in uw mond en slik deze door.
- Neem niet meer dan 8 vloeibare sachets per dag. Wanneer de dagelijkse dosis overschreden wordt, kan men last krijgen van een opgeblazen gevoel.
- Als u een dosis vergeten bent, is het niet nodig de volgende dosis te verdubbelen, ga gewoon verder met de behandeling indien nodig.
- Als de symptomen na gebruik van dit product langer dan een week aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

## 4. Voor gebruik van Reduflux™ vloeibare sachets

- **Als u een zeer beperkt natriumarm dieet volgt of nierproblemen hebt:** dit product bevat natrium en calcium, raadpleeg daarom uw arts of apotheker voor gebruik.
- **Als u medicijnen gebruikt:** het wordt aanbevolen een periode van twee uur aan te houden tussen de inname van dit product en bepaalde andere medicijnen, zoals H2-antihistamine, tetracycline, fluoroquinolon, digoxine, ijzertzouten, ketoconazol, neuroleptische medicijnen, thyroxine, penicillamine, atenolol, metoprolol, propanolol, chloroquine en bisfosfonaten.
- **Als u zwanger bent of borstvoeding geeft:** u kunt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding Reduflux™ vloeibare sachets gebruiken. Echter, het wordt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding aangeraden uw arts of apotheker te raadplegen voor gebruik van elk middel.
- **Als u allergisch bent voor één van de ingrediënten:** gebruik Reduflux™ vloeibare sachets dan niet.

## 5. Na inname van Reduflux™ vloeibare sachets

- Zoals alle producten kunnen Reduflux™ vloeibare sachets bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen die ervaart. Deze vloeibare sachets veroorzaken zeer zelden een allergische reactie op de ingrediënten. Symptomen van een allergische reactie kunnen huiduitslag, jeuk, moeilijkheden met ademen, duizeligheid of zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel omvatten.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raad-

pleeg dan uw arts of apotheker.

- Als zich na het innemen van Reduflux™ vloeibare sachets een medische aandoening voordoet, raadpleeg dan uw arts.

## 6. Hoe bewaart u Reduflux™ vloeibare sachets

- Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
- Bewaren beneden 25°C.
- Niet in de vriezer of de koelkast bewaren.
- Niet gebruiken na de vervaldatum: zie verpakking en sachet.
- Dit product mag niet afgevoerd worden via het afvalwater of huisvuilcontainer. Vraag uw apotheker hoe producten die niet langer nodig zijn, afgevoerd moeten worden. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Reduflux™ vloeibare sachets zijn ook verkrijgbaar in Reduflux™ kauwtabletten met pepermuntsmak.

Reduflux™ tabletten en vloeibare sachets zijn producten van Bional Medical. De maag-darmproducten van Bional Medical zijn effectieve producten van natuurlijke oorsprong die wetenschappelijk zijn bewezen. Is uw maag-darmstelsel om welke reden dan ook uit balans? Dan biedt Bional Medical eenvoudige oplossingen die u helpen het evenwicht te herstellen en uw maag-darmstelsel gezond te houden.

- Bional Medical **Regulamine™ sachets:** voor een regelmatige stoelgang en goede darmbalans.
- Bional Medical **Reduflux™ tabletten en vloeibare sachets:** bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Werkt snel en tot wel 4 uur lang.
- Bional Medical **Redugas™:** snelle maar zachte verlichting bij een opgeblazen gevoel en winderigheid door herstel van de darmflora.
- Bional Medical **Dimexanol™ en Dimexanol™ voor kinderen:** effectieve, natuurlijke 2-in-1-behandeling voor diarree die de symptomen behandelt en het vochttekort in het lichaam aanvult.

Dit zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Kijk voor meer informatie op [www.bional.nl](http://www.bional.nl)

### Fabrikant:

InQpharm Europe Ltd., Waldseeweg 6, 13467 Berlijn, Duitsland

### Distributeur:

Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,  
3002 AP Rotterdam, Nederland



Reduflux™ vloeibare sachets is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

### Datum aangepast

Oktober 2012