

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

# ROTHER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop Noscapine

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop en waar voor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop inneemt
3. Hoe wordt ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop
6. Aanvullende informatie

### 1. WAT IS ROTHER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

#### Geneesmiddelengroep

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel.

Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

#### Gebruiken

- bij prikkelhoest.

### 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ROTHER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP INNEEMT

#### Gebruik ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop.

*Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest*

#### Wees extra voorzichtig met ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

#### Gebruik van ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop en andere (genees)middelen.

*Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.*

#### Zwangerschap en borstvoeding

##### Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

##### Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

##### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettenheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

#### Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ROTHER Noscapect 1 mg/ml, stroop

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering

(=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmlachten en diarree veroorzaken. Dit product bevat methylparahydroxybenzoesaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

### 3. HOE WORDT ROTER NOSCAPECT 1 MG/ML, STROOP INGENOMEN

Volg bij het gebruik van ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

#### De gebruikelijke dosering is

##### ***Volwassenen***

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

##### ***Kinderen van 6-12 jaar***

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

##### ***Kinderen van 3-6 jaar***

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

*Als u merkt dat ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

#### Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

*U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.*

### Wat u moet doen wanneer u meer van ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

### Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop om zo de vergeten dosis in te halen.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

#### ***Afweersysteem***

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

#### ***Zenuwstelsel***

Sufheid, duizeligheid.

#### ***Maag- en darmstelsel***

Misselijkheid.

*Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

### 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

*Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.*

Gebruik ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

### 6. AANVULLENDE INFORMATIE

#### Wat bevat ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop

- Het werkzame bestanddeel is noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoesaat(E218) saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoer ziet ROTER Noscapect 1 mg/ml, stroop er uit en wat is de inhoud van de verpakking  
Flacon à 150 en 300 ml stroop.

#### Hoeder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Imgrota B.V.  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen

In het register ingeschreven onder  
RVG 102471, stroop 1 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013

0213.1v.AP / 97.708.217-A

31028669.01