

Tasectan®

Capsules / poeder voor gebruik bij kinderen

Toepassing:

Tasectan is een medisch hulpmiddel dat de fysiologische functies van de darmwand herstelt. Tasectan is speciaal ontwikkeld om de effecten die gepaard gaan met diarree (zoals buikkramp en overmatige ontlasting) te bedwingen en te verminderen. Tasectan helpt bij de verschillende oorzaken van diarree. Effectief binnen 12 uur.

Tasectan bevat gelatinetannaat (een verbinding van gelatine en tanninezuur) dat door zijn werking het ontstoken darmslijmvlies beschermt. Gelatinetannaat vormt een laagje op het darmslijmvlies (mucoadhesieve beschermingslaag) door te binden aan de eiwitten in de darmwand (mucoproteïnen) die verantwoordelijk zijn voor de (plaatselijke) ontsteking. Hierdoor wordt de oorzaak geïsoleerd en via de ontlasting afgevoerd. De samenstelling van Tasectan (gelatinetannaat) verandert niet in de maag en vormt een laagje dat het darmslijmvlies beschermt, waardoor de frequentie en de duur van de diarree verminderen. Het product is verkrijgbaar als capsules voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar en als poeder voor kinderen vanaf 0 jaar.

Verpakking:

Blisterverpakking met 8 capsules van 500 mg.
10 sachets van 250 mg (voor gebruik bij kinderen).

Samenstelling:

Capsules: Gelatinetannaat, Zetmeel, Magnesiumstearaat.
Poeder voor gebruik bij kinderen: Gelatinetannaat.

Gebruik:

Capsules: Neem de capsules in met water.
Poeder: Meng de inhoud van één sachet in een glas water. De inhoud kan ook worden toegevoegd aan vruchtensap of yoghurt.

Dosering:

Volwassenen: 1 à 2 capsules om de 4 tot 6 uur totdat de symptomen zijn verdwenen.
De dosering mag zo nodig, in overleg met uw arts, worden verhoogd.
Kinderen van 0 tot 3 jaar: 1 sachet om de 6 uur totdat de symptomen zijn verdwenen.
Kinderen van 3 tot 14 jaar: 1 à 2 sachets om de 6 uur totdat de symptomen zijn verdwenen.

Waarschuwingen:

Houd rekening met de volgende waarschuwingen:

- Voor gebruik bij kinderen: er zijn geen gevallen bekend die aanleiding geven om vóór gebruik van dit product een arts te raadplegen.
- Gebruik Tasectan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.
- Gebruik de capsule / sachet niet als de blisterverpakking of de sachet open of beschadigd is.
- Hoewel er geen bijwerkingen bekend zijn, wordt afgeraden het product tijdens de zwangerschap of in de eerste maanden van de borstvoeding te gebruiken. Raadpleeg vóór gebruik in ieder geval altijd uw arts.
- Raadpleeg uw arts als de irritatie van de darmwand of de diarree aanhoudt.
- Bewaar Tasectan bij kamertemperatuur, en niet in de buurt van een warmtebron.
- Vries Tasectan niet in.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties en bijwerkingen:

Voor dit product zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen gemeld.

Distributeur:

Fores tHealthcare BV
Franciscusweg 277
1216 SG Hilversum

 Novintethical Pharma SAGL
Via Pian Scairolo, 11
6915 Lugano - Switzerland

Rev: 03 dated 15/12/2011

