



Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht binnen 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie



1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Zovirax Koortslip crème versnelt de genezing van de koortslip en verkort de periode van pijn. Zovirax Koortslip crème kan gebruikt worden voor de behandeling van een koortslip veroorzaakt door het herpesvirus.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor een van de overige bestanddelen van de crème.



Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Zovirax Koortslip crème dient alleen gebruikt te worden bij een koortslip op de mond en de huid rondom de lippen. Vermijd elk contact met uw slijmvliezen, zoals in de mond, het oog of de vagina, aangezien hierbij irritatie zou kunnen optreden.
- Zovirax Koortslip crème mag niet worden gebruikt voor de behandeling van genitale herpes.
- Indien u een ernstig verminderde werking van het afweersysteem (bijv. indien u AIDS patiënt bent of wanneer u een ontvanger bent van een beenmergtransplantaat) heeft kunt u toediening met Zovirax tabletten overwegen. Vraag uw arts om advies over de behandeling van iedere infectie.
- De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties veroorzaken en de hulpstof cetylalcohol kan lokale huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Contact met de ogen vermijden: Als u per ongeluk crème in uw oog krijgt, onmiddellijk grondig uitspoelen met water. Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn van het plaatselijk toedienen van aciclovir, zoals bij de behandeling van een koortslip met Zovirax Koortslip crème, geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Zovirax Koortslip crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten van Zovirax Koortslip op de gezondheid van u of van uw ongeboren of pasgeboren kind. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Indien u borstvoeding geeft, mag u Zovirax Koortslip crème slechts gebruiken na overleg met de arts. Het werkzame bestanddeel wordt in de moedermelk uitgescheiden. Echter de hoeveelheid die baby's hierdoor kunnen binnenkrijgen is verwaarloosbaar.

In verband met het risico van besmetting van de baby dient u bij het geven van borstvoeding tijdens een koortslipaanval extra op te letten. Omdat het afweermechanisme van baby's nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties bij hen zeer heftig verlopen. Het is dus erg belangrijk om vooraf uw handen te wassen en een mondmasker te dragen tijdens het voeden en verzorgen van uw baby. Voor uw partner en familieleden gelden dezelfde regels. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zovirax Koortslip heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties veroorzaken en de hulpstof cetylalcohol kan lokale huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Wanneer u merkt dat delen van uw lippen pijnlijk worden, juist gevoelloos zijn, gloeien of jeuken, zijn dit voortekenen van koortslipblaasjes.



Indien u regelmatig last heeft van koortsblaasjes herkent u deze tekenen en kunt u de aanval voelen aankomen. Breng dan zo spoedig mogelijk op deze plaatsen Zovirax Koortslip crème aan volgens het voorschrift. De behandeling kan echter ook in een latere fase worden gestart.

Dosering

Volwassenen en kinderen:

- Breng zodra u klachten krijgt, 5 maal per dag, met tussenpozen van 4 uur, Zovirax Koortslip crème aan. 's Nachts hoeft u geen crème aan te brengen.

De behandeling dient gedurende 4 dagen te worden voortgezet.

Wanneer de genezing na tien dagen, gerekend vanaf het begin van de behandeling, niet volledig is wordt u geadviseerd een arts te raadplegen.

Indien u herhaaldelijk aan een ernstige koortslip lijdt, verdient het aanbeveling uw arts te raadplegen.

Wijze van toediening

- Breng Zovirax Koortslip aan door een beetje crème uit de tube of de pomp op uw vingertop te knijpen en dit vervolgens op de aangedane delen aan te brengen. De aangedane delen zijn die delen, ook van de lippen, waar de infectie actief is, dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn verschenen.
- Om overdracht van het virus op andere delen van het lichaam (bijv. de ogen) of op andere personen (bijv. door kussen) te voorkomen is het van belang om aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en uw handen te wassen voor en nadat u de blaasjes heeft aangeraakt.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Zovirax Koortslip te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem contact op met uw arts of apotheker als u teveel Zovirax Koortslip crème 50 mg/g heeft gebruikt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat u nadelige gevolgen ondervindt als u de crème per ongeluk inslikt, maar neem contact op met uw dokter als u bijwerkingen krijgt of zich zorgen maakt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng Zovirax Koortslip crème alsnog aan en ga verder met de behandeling zoals aangegeven onder het kopje "dosering en wijze van toediening".

Als u stopt met het gebruik van dit middel.

Het gebruik van Zovirax Koortslip kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.



4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Zovirax Koortslip bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Aandoeningen van de huid of onderhuid

Soms:

- Licht stekend of branderig gevoel op de plaats van het aanbrengen.
- Licht uitdrogen of schilferen van de huid.
- Jeuk.

Zelden:

- Overgevoeligheid in de vorm van huiduitslag.
- Roodheid van de huid na het aanbrengen van de crème.

Aandoeningen van het afweersysteem

Zeer zelden:

- Overgevoeligheidsreacties, waaronder:
 - angio-oedeem. Dit is een plotselinge jeukende vochtophoping in de huid en slijmvliezen, die eventueel gepaard gaat met ademhalingsmoeilijkheden of huiduitslag. Indien deze laatste symptomen zich voordoen, staak dan het gebruik van Zovirax Koortslip crème en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 - Galbulten/Netelroos (Urticaria)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Niet bewaren boven 25°C.
- Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Op de buitenverpakking staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) van Zovirax Koortslip crème aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door "Niet te gebruiken na". Op tube of doseerpomp is de uiterste gebruiksdatum vermeld achter "exp".

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is aciclovir. Eén gram crème bevat 50 mg aciclovir.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: propyleenglycol, vaseline, cetostearylalcohol, vloeibare paraffine, poloxameer 407, natriumlaurylsulfaat, glycerol monostearaat, macrogol stearaat 100, dimethicon 20 en gezuiverd water.

Hoe ziet Zovirax Koortslip eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zovirax Koortslip is een witte crème en is als tube of als pomp à 2g te verkrijgen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare bv
Postbus 757
3700 AT Zeist

Fabrikant:
Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road, Barnard Castle
County Durham, UK

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Zovirax Koortslip, crème 50mg/g: RVG 19078

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2015