

Betadine®

100 mg/g povidonjood

Wondpleisters met Betadine® oplossing

Te gebruiken bij:

Het reinigen, behandelen of voorkomen van infecties van oppervlakkige brand-, snij-, of schaafwonden.

Niet te gebruiken bij:

- Pasgeborenen en te vroeg geboren
- Een overmatige schildklierwerking
- Jodiumovergevoeligheid

Gebruiksaanwijzing:

- Wond reinigen • Huid droogdeppen voor een goede hechting
- Pleister direct op de wond aanbrengen
- Tenminste 1 x per dag pleister vernieuwen (vaker indien nodig)
- Betadine desinfectiepleisters niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen

Waarschuwing:

Op een donkere plaats, bij 15-25°C en buiten bereik van kinderen bewaren

Inhoud van de doos:

10 strips, 10 cm lang, 6 cm breed elastische Betadine desinfectiepleister. De pleisters zijn geschikt voor wondjes op bewegende lichaamsdelen (bv. knieën). De pleister rekt mee, vermindert de kans op wondverontreiniging, geeft optimale vochtbalans door microporiën, weinig kans op huidirritatie en hecht zich niet aan de wond.

Registratiehouder:

Meda Pharma B.V., Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

MEDA